

علیرغم تحويل شربت متادون در ظروف دارویی، مشاهده شده که برخی افراد در حال ترک اعتیاد به دلیل ترس از آگاهی افراد خانواده از اعتیاد ایشان ، متادون را به ظرف غیر دارویی منتقل می نمایند. لذا تاکید می شود که بیماران مصرف کننده متادون و نیز خانواده افراد معتاد، از نگهداری دارو در ظروفی مانند شیشه نوشابه، شیشه آب لیمو و ... خودداری نمایند و به منظور جلوگیری از مصرف اشتباه این دارو، از قرار دادن آن در مجاورت سایر نوشیدنی ها جدا اجتناب نمایند.

توصیه های خومراقبتی

منبع:

درسنامه پرستاری کودکان ونگ. ۱۳۹۴. ترجمه پوران سامی، محمود بدیعی، فاطمه احمدی. تهران: نشر و تبلیغ بشری، ۱۳۹۵ص. ۱۳۲۴.

مسنومیت با متادون



تهیه و تنظیم: کمیته آموزش سلامت بخش اورژانس
تحت نظرارت: سوپر وایزر آموزش سلامت

تیر ۱۳۹۹



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

آرزوی سلامتی برای شما و فرزند دلبندتان برای کسب اطلاعات و پیگیری، اطلاعات تماس مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی هفده شهریور رشت به شرح ذیل می باشد:

آدرس : رشت، خیابان نامجو، خیابان شهید سیادتی، ضلع جنوبی پارک شهر، مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ۱۷ شهریور رشت

شماره تماس بیمارستان (بخش اورژانس):
۰۱۳-۳۳۳۶۹۳۹۱-۳۳۳۶۹۰۴۴-۲۳۷

آدرس صفحه "آموزش به بیمار" بیمارستان:

<http://www.gums.ac.ir/17shahrivar>



پیشگیری از مسمومیت:

- از ریختن این دارو در شیشه نوشابه و نگهداری در یخچال و هر روشی که منجر به در دسترس بودن و مصرف اتفاقی آن توسط کودک گردد باید خودداری شود. پسر بچه های سه، چهار، پنج و شش ساله و دختران دو، سه، چهار و پنج و هفت ساله قربانیانی بوده اند که به اشتباه، بطری نوشابه و یا لیوان حاوی شربت متادون را نوشیده اند.
- کودکان را از بستگان، میهمانان و یا از همسایگان فرد معتاد دور نگهدارید.

والدین دقت نمایید که در صورت مصرف هر گونه دارو برای کودک خود (مانند استامینوفن، شربت سرماخوردگی،.....) پیش از مصرف از درست بودن محتويات ظروف دارویی اطمینان حاصل نمایند و در صورت تردید به آغشته بودن آن با داروی ترک اعتیاد متادون جدا از مصرف آن برای کودک خودداری نمایند.

علایم مسمومیت با متادون:

- در صورت بروز علائم زیر حتما به مسمومیت شک کنید و کودک را سریعا به اولین مرکز درمانی برسانید:
- کاهش سطح هوشیاری
 - کاهش تعداد تنفس
 - مردمک های کوچک در کودکان
 - مرکز ثبت عوارض ناخواسته داروهای (ADR) تا کنون دوازده مورد مرگ ناشی از مسمومیت اتفاقی با شربت متادون دریافت نموده است که ده مورد از آنان کودکان ۲ الی ۷ ساله ای بوده اند که بدليل بي احتياطي فرد معتاد مصرف کننده متادون، والدین و یا سرپرستاران خانواده، دچار عارضه گشته اند.



والدین گرامی با آرزوی شفای عاجل برای فرزند دلbindتان، مطالب زیر جهت افزایش آگاهی شما در مورد بیماری فرزندتان می باشد لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

متادون:

متادون با تجویز پزشک در درمان اعتیاد مورد استفاده قرار میگیرد اما در صورت مصرف سهل انگارانه و غیر مسئولانه این دارو ممکن است خطرات جدی ایجاد شود. متادون داروی بالقوه سمی است که مقدار مورد نیاز آن برای درمان به مقدار سمی این فرآورده بسیار نزدیک است لذا در تجویز، ارائه، نگهداری و مصرف آن می بایست دقت و احتیاط فراوان نمود. این دارو می تواند برای کسانی که آن را به طور منظم دریافت نمی کنند فوق العاده خطرناک باشد، چرا که این افراد نسبت به اثرات آن تحمل پیدا نکرده اند. این دارو حتی در مقدارهای بسیار پایین تر برای کودکان کشنده است.