



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان  
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی  
۱۷ شهریور رشت

## حساسیت دارویی چیست؟



تهیه و تنظیم: کمیته آموزش سلامت بخش داخلی ۱  
تحت نظارت: سوپروایزر آموزش سلامت

شهریور ۱۴۰۱

با آرزوی سلامتی برای شما و فرزند دلبندتان برای کسب اطلاعات و پیگیری، اطلاعات تماس مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی هفده شهریور رشت به شرح ذیل می باشد:

آدرس: رشت، خیابان نامجو، خیابان شهید سیادت، ضلع جنوبی پارک شهر، مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ۱۷ شهریور رشت

شماره تماس بیمارستان:

(۳۴۹) - ۳۳۳۶۹۰۴۴ - ۳۳۳۶۹۳۹۱ - ۰۱۳

آدرس صفحه "آموزش به بیمار" بیمارستان:

<https://17shahrivar.gums.ac.ir>



منبع:

جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر. ۱۳۹۴. درسنامه ی پرستاری داخلی و جراحی ج ۸: ایمونولوژی. ترجمه ی فروزان آتش زاده شوریده. تهران. جامعه نگر. ص ۹۰ - ۱۱۵.

## آیا می دانید چگونه بعد از ترخیص از کودک مراقبت کنید؟

- کودک را با آب ولرم مرتب استحمام نمایید.

- بهداشت فردی مانند شستشوی دستها و بدن مادر و کودک رعایت شود..

- هنگام مراجعه به پزشک سابقه مصرف داروها و حساسیت دارویی خود و مدت زمان مصرف دارو تا بروز علائم و ویژگی حساسیت دارویی را اطلاع دهید.

- در صورت امکان داروهای باقیمانده یا قوطی و پاکت داروها را نیز همراه داشته باشید.

- در صورت بروز علائم زیر به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید:

- خارش و تورم پوست
- تنگی نفس
- خواب آلودگی
- تب و لرز

توصیه های خودمراقبتی

.....

.....

.....

## چگونه حساسیت دارویی تشخیص داده می شود؟

- شرح حال بیمار (سوال از والدین) و سابقه مصرف دارو
- علایم حساسیت

## آیا می دانید درمان حساسیت دارویی چیست؟

در صورتی که حساسیت نسبت به دارویی محرز شود باید فوراً مصرف آن دارو قطع گردد و به پزشک جهت معاینه مراجعه شود و پزشک معالج در صورت صلاحدید داروهای ضد حساسیت مثل آنتی هیستامین تجویز خواهد کرد. اینگونه داروها باعث کاستن علایم حساسیت خواهند شد. در موارد معدودی نیز داروهای کورتونی لازم می شود.

## آیا از تغذیه صحیح در زمان حساسیت دارویی اطلاع دارید؟

- مصرف مایعات فراوان
- در صورت ضایعات دهانی، مواد غذایی خنک و غیر محرک
- وعده های غذایی با حجم کمتر و تعداد دفعات بیشتر

## آیا از میزان صحیح فعالیت در زمان بروز علائم اطلاع دارید؟

عدم محدودیت از نظر فعالیت اما در صورت شدت بیماری و وجود تب ، استراحت در بستر توصیه می شود.

• تنگی نفس و احساس سنگینی سینه

• خواب آلودگی

• رنگ پریدگی و تعریق

• آبریزش بینی و عطسه


• کهیر

• تب و لرز

• سردرد و سرگیجه

• جاری شدن اشک

• سرفه یا خشک شدن گلو و اختلالات در بلع



## می دانید معمولاً چه داروهای باعث ایجاد حساسیت

### دارویی می شوند؟

علی رغم اینکه هر دارویی می تواند باعث ایجاد حساسیت شود اما احتمال بروز حساسیت نسبت به برخی داروها بیشتر است. برای مثال:

- داروهای آنتی بیوتیک مثل پنی سیلین و سایر آنتی بیوتیک ها - داروهای شیمی درمانی
- برخی داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های ناشی از ضعف سیستم ایمنی
- داروهای ضد تشنج (فنوباریتال-کاربامازپین-لاموتریژن و ...)

والدین گرامی، مطالب زیر جهت افزایش آگاهی شما در مورد بیماری فرزندان می باشد لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

## منظور از حساسیت دارویی در کودکان چیست؟

حساسیت دارویی در کودکان، واکنش طبیعی سیستم ایمنی بدن نسبت به بعضی از داروها می باشد. حساسیت دارویی می تواند ناشی از داروهای شیمیایی یا داروهای گیاهی باشد. علایم حساسیت در همه کودکان به یک شکل ظاهر نمی شود بلکه این علایم بسته به نوع دارو و سیستم ایمنی افراد در کودکان متفاوت می باشد.



## آیا علایم حساسیت دارویی در کودکان را می

### شناسید؟

معمولاً علایم ناشی از حساسیت دارویی یک ساعت بعد از مصرف دارو آشکار می شود اما در برخی موارد حساسیت پس از چند دقیقه، چند ساعت، چند روز و یا حتی چند هفته ظاهر می شود. شایع ترین علایم حساسیت در کودکان عبارتند از:

- خارش و تورم پوست
- پیدایش لکه های قرمز رنگ روی سطح پوست
- گرم شدن پوست ناحیه درگیر شده