




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

با داروی "فنوباربیتال" آشنا شوید



تهیه و تنظیم: کمیته آموزش سلامت بخش داخلی ۱

تحت نظارت: سوپروایزر آموزش سلامت

شهریور ۱۴۰۱

با آرزوی سلامتی برای شما و فرزند دلبندتان برای کسب اطلاعات و پیگیری، اطلاعات تماس مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی هفده شهریور رشت به شرح ذیل می باشد:

آدرس: رشت، خیابان نامجو، خیابان شهید سیادت، ضلع جنوبی پارک شهر، مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ۱۷ شهریور رشت

شماره تماس بیمارستان (بخش داخلی ۱):

۰۱۳-۳۳۳۶۹۳۹۱-۳۳۳۶۹۰۴۴-(۳۴۹)

آدرس صفحه "آموزش به بیمار" بیمارستان:

<https://17shahrivar.gums.ac.ir>



منبع:

رسولی م. ۱۳۹۵. داروهای ژنریک ایران مرجع کامل با اقدامات

پرستاری. چاپ دهم. تهران: انتشارات اندیشه رفیع. ص ۸۳۰ تا

۸۳۲.

در زمان مصرف دارو به چه نکاتی باید توجه شود؟

۱. مصرف دارو دقیقاً طبق دستور پزشک باشد.

۲. از قطع ناگهانی دارو بپرهیزید..

۳. به دلیل ایجاد خواب الودگی پس از مصرف دارو از انجام فعالیت های پرخطر بپرهیزید.

۴. با توجه به عارضه خواب الودگی حرکات بیمار را تحت نظر قرار دهید..

۵. به این نکته توجه کنید که اثر درمانی دارو بعد از ۲ تا ۳ هفته ظاهر میشود.

۶. در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه (اتاق) نگهداری شود و در دسترس کودک نباشد.

این دارو با چه داروهایی تداخل دارد و نباید همزمان

با آنها مصرف شود؟

- داکسی سایکلین
- متوکسی فلوران
- داروهای محرک مغزی
- داروهای انتی هیستامین دکو نژستانت

توصیه های خودمراقبتی:

.....

.....

.....

عارضه استیون جانسون در مصرف فنوباریتال چیست؟

نوعی سندرم نادر که ممکن است به دنبال مصرف فنوباریتال ایجاد شود و پوست و مخاط و قسمت هایی مانند دهان و گوش و مجاری ادراری و یا چشم را درگیر کند که همراه با تب و بی قراری و ضایعات پوستی قرمز و متورم و پوسته دهنده و زخم می باشد.



در زمان بروز عارضه چه اقدامی انجام دهیم؟

دارو را قطع نموده و به مطب پزشک مربوطه یا نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه می کنیم.

نحوه مصرف "فنوباریتال" چگونه است؟

- این دارو را میتوان بعد یا قبل از غذا مصرف کرد ولی بهتر است جهت جلوگیری از مشکلات گوارشی بعد از غذا مصرف شود.
- این دارو را میتوان با آب یا ابمیوه یا شیر مصرف نمود
- میتوان دارو را در دو وعده در شبانه روز یا کل دارو در یک وعده شبانه مصرف کرد.



داروی "فنوباریتال" چه عوارضی دارد؟

- در مغز و نخاع: در اوایل خواب الودگی، گاهی کابوس شبانه، و بی خوابی، گیجی و بی قراری
- در پوست: ضایعات پوستی به شکل دانه های قرمز
- در گوارش: تهوع، استفراغ، درد معده، و به ندرت یبوست
- قلب: در موارد استفاده با دوز بالا کاهش فشار خون، کاهش ضربان قلب

مهم ترین عوارض جانبی شایع "فنوباریتال" چیست؟

- راش (ضایعات پوستی)
- خواب الودگی و اختلال تعادل در شروع درمان
- در صورت ادامه از عوارض پوستی غیر شایع استیون جانسون

والدین گرامی با آرزوی شفای عاجل برای فرزند دلبدتان، مطالب زیر جهت افزایش آگاهی شما در مورد "داروی مصرفی" فرزندتان می باشد لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

عارضه دارویی چیست؟

اثرات ناخواسته ای است که در اثر مصرف دارو به دنبال مصرف خودسرانه یا در اثر مصرف داروهایی که پزشک هم نسخه می کند در بعضی از بیماران بوجود می آید.

با داروی فنوباریتال آشنا شوید:

جزء داروهای ضد تشنج و خواب آور و آرامبخش می باشد. و برای کنترل بیماری فرزندتان توسط پزشک تجویز شده است و بایستی طبق مقدار تعیین شده و به موقع داده شود تا از تکرار دفعات تشنج جلوگیری شود. فرم تزریقی این دارو برای درمان اضطرابی بعضی از حملات تشنجی حاد تجویز می شود و در زمان بستری در بیمارستان مصرف می شود.

اسامی تجاری (نامگذاری دارو توسط شرکت) دارو:

Burbito (باربیتو)، lumina (لامینال)، laminalette (لامینالت)

اسم ژنریک (نام عمومی) دارو:

فنوباریتال

دارو به چه شکلی وجود دارد؟

قرص: با دوزهای ۱۵ و ۶۰ و ۱۰۰ میلی گرم

آمپول: با دوزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم.