




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

آیا می دانید عدم نزول بیضه (کریپتورکیدیسم) چیست؟



بیضه نزول نکرده

بیضه در وضعیت طبیعی

تهیه و تنظیم: کمیته آموزش سلامت بخش جراحی
تحت نظارت: سوپروایزر آموزش سلامت

فروردین ۱۴۰۲

شماره تماس بیمارستان ۱۷ شهریور:

۰۱۳-۳۳۳۶۹۳۹۱-۳۳۳۶۹۰۴۴

شماره تماس بخش جراحی:

۰۱۳-۳۳۳۶۹۳۱۶

آدرس صفحه محتواهای "آموزش به بیمار" بیمارستان:

<https://17shahrivar.gums.ac.ir>



(برای مشاهده فیلم و مطالعه مطالب آموزشی کد را اسکن نمایید)

منبع:

میرلاشاری ژ، رسولی م. ۱۴۰۰. پرستاری کودکان کودک بیمار.

چاپ سوم. تهران: اندیشه رفیع: ۱۴۹ - ۱۴۷.

آیا می دانید چگونه پس از ترخیص از فرزندتان

مراقبت کنید؟

۱- داروهای تجویز شده را تا زمان تعیین شده و در ساعت مشخص مصرف کنید.

۲- محل جراحی را از آلودگی و مدفوع، تمیز نگهدارید.

۳- از فعالیت های شدید توسط کودک اجتناب نمایید.

۴- به پزشک جهت معاینه پس از ترخیص در تاریخ تعیین شده مراجعه نمایید تا از قرار گرفتن بیضه درون کیسه اطمینان حاصل شود.

۵- در صورت بروز موارد زیر سریعاً به پزشک مراجعه

نمائید:

- درد ناحیه جراحی
- تورم ناحیه جراحی
- ضعف و بی حالی
- تب
- قرمزی یا ترشح در ناحیه ی جراحی

توصیه های خود مراقبتی

.....

.....

.....

آیا از فعالیت در زمان قبل و بعد عمل اطلاع دارید؟

قبل عمل: کودک کم تحرک باشد و بیشتر در تخت استراحت نماید.

بعد عمل: بهتر است کودک کاملاً در تخت استراحت نموده یا فعالیت کمی داشته باشد چون فعالیت بیش از حد بهبودی را به تاخیر می اندازد.

دقت کنید: بازی با وسایلی که کودک مجبور میشود با پای باز بایستد یا بنشیند تا ۲ هفته ممنوع است. (برای جلوگیری از جابجایی بیضه)

آیامی دانید چگونه احساس درد را در فرزندتان را

کنترل نمایید؟

- کودک را در اغوش بگیرید.
- با او صحبت کنید.
- از داروی مسکن تجویز شده ی پزشک، در ساعت مشخص استفاده کنید.

آیا می دانید "عدم نزول بیضه" چگونه درمان میشود؟

در صورتی که بیضه تا ۶ ماهگی در کیسه بیضه پائین نیامد درمان جراحی اولویت دارد که معمولاً بین ۶ ماهگی تا ۲۴ ماهگی انجام می شود. جراح، بیضه را به درون کیسه بیضه وارد و آن را بخیه می زند.

اگر "عدم نزول بیضه" درمان نشود چه عوارضی دارد؟

۱- عقیمی یا کاهش میزان باروری

۲- وجود فتق همراه

۳- احتمال سرطان بیضه

آیا از تغذیه صحیح در زمان ابتلا به این بیماری اطلاع

دارید؟

قبل عمل: کودک باید ۶ ساعت قبل از عمل ناشتا باشد.

بعد عمل: پس از هوشیاری کودک و طبق دستور پزشک ابتدا با مایعات گرم و مایعات صاف شده و فردای روز جراحی رژیم عادی را برای کودک شروع نمایید.



بعد عمل ابتدا با مایعات گرم و صاف شده تغذیه را شروع نمایید.


والدین، مطالب زیر جهت افزایش آگاهی شما در مورد بیماری فرزندتان می باشد لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

آیا می دانید منظور از "عدم نزول بیضه" چیست؟

نهان بیضگی یا عدم نزول بیضه (کریپتورکیدیسزم) به اختلالی گفته می شود که در آن یک یا دو بیضه در مکان طبیعی خود یعنی در کیسه بیضه نزول نکرده است و این اختلال از بدو تولد وجود دارد.

آیا علائم "عدم نزول بیضه" را می شناسید؟

- خالی بودن کیسه بیضه یک طرفه یا دو طرفه
- قابل لمس نبودن بیضه در کیسه بیضه
- کوچک بودن کیسه بیضه سمت مبتلا (سمتی که بیضه نزول نکرده است)



چگونه عدم نزول بیضه تشخیص داده میشود؟

- ۱- گرفتن شرح حال (سوال پرسیدن در خصوص بیماری) از والدین
- ۲- معاینه کودک توسط پزشک
- ۳- سی تی اسکن، سونوگرافی و MRI