

## شربت فارمنتین

### (کوآموکسی کلاو)

شربت فارمنتین همان کوآموکسی کلاو میباشد که به صورت ۲۲۸ و ۴۵۷ میلی گرمی موجود می باشد. تعیین مصرف هر یک از این شربت، توسط پزشک انجام می شود.

#### موارد مصرف:

آنتی بیوتیک می باشد و در عفونت های مجاری ادراری-تناسلی، عفونت گوش میانی، مجاری تنفسی، برونشیت، عفونت های شکم، عفونت شدید دندان و... استفاده می شود.

#### نحوه و میزان مصرف دارو:

میزان مصرف دارو طبق دستور پزشک و بر اساس سن و وزن کودک می باشد. که اغلب ۲ بار در روز تجویز می شود. مقدار آن در نوزادان بصورت ذیل می باشد:

▪ نوزادان با سن کمتر از ۳ ماه:

۱۵ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن.

▪ نوزادان با سن بیشتر از ۳ ماه و کودکان با

وزن کمتر از ۴۰ کیلوگرم:

۶/۷ تا ۲۲/۵ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم

وزن بدن.

#### موارد منع مصرف:

هر دارویی علاوه بر ایجاد اثر درمانی ممکن است سبب عوارض ناخواسته نیز شود. در صورت وجود سابقه حساسیت آلرژیک به پنی سیلین ها؛ یرقان و اختلال کبد ناشی از مصرف پنی سیلین یا کوآموکسی کلاو، این دارو نباید مصرف شود.

#### عوارض:

شامل تهوع، استفراغ، کهیر، تب، درد مفاصل، هپاتیت، یرقان، کولیت و به ندرت سرگیجه و سردرد و تشنج گزارش شده است. در صورت بروز واکنش شدید مصرف دارو قطع و به پزشک مراجعه شود.

#### روش تهیه سوسپانسیون خوراکی:

از آب جوشیده سرد استفاده شود و در صورت عدم استفاده از آب جوشیده سرد، اثر دارو از بین می رود. ابتدا پودر را تکان داده تا از هم باز شود و سپس آب جوشیده سرد شده را تا خط نشانه روی ظرف، به آن اضافه کنید و سپس شیشه را خوب تکان دهید.

دارو باید در یخچال نگهداری شود.



هوالشفاء



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

گیلان

مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت

## شربت فارمنتین (کو آموکسی کلای)



تهیه و تنظیم:

کمیته آموزشی بخش عفونی

زیر نظر سوپروایزر آموزشی

آبانماه ۱۳۹۵



طول دوره مصرف دارو ۱۰ تا ۱۴ روز است  
که پزشک تعیین می کند که باید دوره درمان  
را کامل کرد.

دارو دور از نور و در درجه حرارت ۲۴ درجه  
نگهداری شود.



منابع:

محتشمی، رضا، داروهای ژنریک ایران، تهران، آثار

سبحان ۱۳۹۱

سبحانی، عبدالرسول سپهری، غلامرضا،

فارماکولوژی، اندیشه آور ۱۳۸۵.



۰۳۱-۳۳۳۶۹۰۳۱



توصیه به والدین:

به وجود خون در ادرار توجه کنید.

به علایمی مانند اسهال، دردهای شکمی و خون  
در مدفوع توجه شود و بلافاصله به دکتر  
اطلاع داده شود.

ممکن است از زمان شروع دارو تا یک هفته  
بعد ضایعات پوستی به وجود آید.

به وضعیت تنفس از نظر تعداد و سختی  
تنفس توجه گردد.

دارو را می توان قبل و بعد از غذا، مصرف  
کرد.

شربت را می توان به تنهایی یا همراه با  
نوشیدنی دیگری مصرف کرد.

در صورت وجود اسهال، مصرف مایعات  
خوراکی زیاد شود.

در صورت باز شدن درب شربت، به مدت ۱۰  
روز در یخچال قابل نگهداری شود.

