

இந்தி



مراقبت پرستاری از کودک مبتلا به بیماری فاویسم

ارایه دهنده: آذر رضاصفت – کارشناسی ارشد پرستاری
کودکان

سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ۱۷ شهریور

۱۴۰۱

**ND₁ - خطر آسیب کلیوی در ارتباط با
رسوب هموگلوبین آزاد در توبول های
کلیه**

مراقبت پرستاری در بیماری فاویسم

✓ توجه به علائم بالینی بیمار :

❖ رنگ پریدگی ، ایکتر ، پررنگی ادرار ، تهوع

، استفراغ ، درد شکم و تب خفیف

❖ تن شویه در صورت بروز تب

❖ توجه به سابقه بیماری فاویسم در خانواده

مراقبت پرستاری در بیماری فاویسم

1. تهیه نمودن هر چه سریعتر PC جهت تزریق به بیمار (در صورت دستور پزشک)
2. کنترل Hb خون بیمار هر ۶ ساعت (طبق نظر پزشک)
3. کنترل Hb ادرار بیمار هر ۶ ساعت (طبق نظر پزشک)
4. کنترل Hb ادرار بیمار هر ۶ ساعت (طبق نظر پزشک)

مراقبت پرستاری در بیماری فاویسم

4. کنترل رنگ و حجم ادرار کودک

1. تشویق نمودن کودک جهت مصرف مایعات شیرین

4. کنترل دمای بدن کودک (تب)

5. توجه به عوارض تزریق خون و اطلاع به پزشک (در صورت تزریق خون)

ND_2 -کمبود آگاهی والدین در ارتباط با
روش های پیشگیری از بروز همولیز

آموزش به والدین

➤ پرهیز از عوامل بروز همولیز :

- 1- پرهیز از مواد غذایی مشکوک شامل :
باقلا به هر صورت (اعم از تازه/ پخته/ فریز شده و...)
- 2- پرهیز از مواد آرایشی مشکوک به ویژه حنا
- 3- پرهیز از مواد شیمیایی به ویژه نفتالین

آموزش به والدین

• ۴- عدم مصرف داروهای مانند:

کوتریموکسازول، ویتامین K، کلروکین، آسپرین،

پریماکین، فنازوپریدین، سولفامتوکسازول، و...

آموزش به والدین

6. شناخت علایم فاویسم:

7. تب، تهوع، استفراغ، دل درد، اسهال، تیره

شدن رنگ ادرار، سرگیجه، رنگ پریدگی،

تپش قلب

آموزش به والدین

- تن شویه در هنگام تب با یا بدون تب بر (فقط استامینوفن)
- هیدراتاسیون در همه بیماران بستری انجام می شود.
- معمولا حجم سرم به میزان یک ونیم برابر میزان **maintenance** محاسبه می شود.
- معمولا از سرم قندی با اضافه کردن سدیم کلراید استفاده می گردد.
- سرم بیمار باید فاقد پتاسیم باشد.

آموزش به والدین

- در صورت موثر بودن هیدراتاسیون افزایش قابل ملاحظه برون ده ادراری و همزمان روشن شدن تدریجی ادرار ملاحظه می شود.
- نداشتن حجم ادرار مناسب (ولو تیره) علیرغم دریافت سرم کافی، شک به نارسایی کلیه ثانوی به رسوب هموگلوبین را افزایش می دهد.

آموزش به والدین

وقتی کودک فاویسمی در معرض برخی داروها، عفونت قرار بگیرد یا باقلا مصرف کند ۵ تا ۲۴ ساعت پس از تماس دچار حملات فاویسم : تب، بی حالی، تیره شدن ادرار به رنگ چای یا خون، کاهش ادرار، سرگیجه، زردی و... می شود.

در این صورت، مایعات شیرین مثل آب انگور به کودک داده و او را به بیمارستان برسانید.

نکته:

- چنانچه مادر کودک فاویسمی ، باقلا مصرف نماید، توصیه می شود تا ۳ روز از دادن شیر مادر به کودک فاویسمی خود، خودداری نماید.

خلاصه

- علت بیماری فاویسم، نقص یا کمبود آنزیمی در گلوبول قرمز است.
- وقتی کودک فاویسمی در معرض برخی داروها و یا عفونت قرار بگیرد یا باقلا مصرف کند ۵ تا ۲۴ ساعت پس از تماس دچار حملات فاویسم می شود که بایستی مایعات شیرین به کودک داده و او را هرچه سریعتر به بیمارستان رسانید.



موفق باشيد