



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کیلان  
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی  
۱۷ شهریور رشت

## آنچه در مورد "نوزاد نارس" باید بدانید؟



تهییه و تنظیم: کارگروه آموزش سلامت بخش NICU

تحت نظرارت: سوپر وایزر آموزش سلامت

۱۴۰۲ بهمن

توصیه های خود مراقبتی:

- .....
- .....
- .....
- .....

آدرس: رشت، خیابان نامجو، خیابان شهید سیادتی، ضلع جنوبی پارک شهر، مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ۱۷ شهریور رشت

شماره تماس بیمارستان (NICU):

۰۱۳-۳۳۳۶۹۳۹۱-۳۳۳۶۹۰۴۴-(۲۷۰)

شماره تماس جهت پاسخ به سوالات درباره شیر مادر:

۰۹۰۵۵۹۸۲۱۱۷

آدرس صفحه "آموزش به بیمار" بیمارستان:

<https://17shahrivar.gums.ac.ir>



منبع:

هاکنبری مریلین، ویلسون دیوید، راجرز شریل. ۲۰۱۹. پرستاری کودکان و نوجوان کودک بیمار. ترجمه سونیا آرزومنیاس، مهناز شوقی، مهناز سنجری. تهران: جامعه نگر. ۳۵۷-۳۸۹.

آیا مراقبت های بعد از ترخیص را می دانید؟

- درجه حرارت نوزاد را کنترل نمایید. (درجه حرارت مناسب بدن نوزاد با دماسنجه زیر بغل ۳۶ تا ۵، ۳۶.۵ درجه سانتیگراد درجه حرارت مناسب اتفاق برای نواد نارس ۲۵ تا ۲۶ درجه سانتی گراد می باشد).
- در روزها و حتی هفته اول بعد از ترخیص به خصوص در فصول سرد سال به نوزاد کلاه بپوشانید.
- تداوم تغذیه با شیرمادر بنا به تقاضای نوزاد و یا هر ساعت را رعایت کنید و با هر نوبت زیر سینه گذاشتن نوزاد حداقل شیردهی را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه انجام دهید.
- اولین معاینه نوزاد بایستی ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از ترخیص صورت گیرد. مراجعات بعدی هر هفته یکبار است تا زمانی که وزن نوزاد به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ گرم افزایش یابد. بعد از آن مراجعات را دو هفته یکبار و سپس ماهیانه ادامه دهید.

ویزیت چشم پزشکی در ۴ تا ۶ هفتگی حتما باید انجام شود.

در صورت بروز علایم زیر به مرکز درمانی مراجعه

کنید:

- افت هوشیاری و بی حالی
- تنفس کشیدن، کبود شدن صورت، لب ها و اندام تحتانی مانند پا
- بر جسته شدن شکم و عدم اجابت مزاج
- شیر نخوردن و مکیدن ضعیف
- استفراغ های مکرر

## وضعیت صحیح قرار گیری نوزاد چگونه است؟

هدف آن است نوزاد بتواند در موقعیت راحت به صورت وضعیت جمع با قرار گیری اندام ها در خط وسط قرار گیرد تا تنفس او بهبود یابد. میتوانید از آشیانه، ملافه های نرم لوله شده استفاده کنید.



مراقبت آغوشی

## می دانید چگونه بیقاراری را در نوزاد مدیریت کنید؟

- ایجاد یک محیط آرام و ساكت
- کاهش نور و روشنایی محیط
- کاهش تحریکات بوبایی
- نواش نوزاد و مراقبت آغوشی



۳

بعد از تولد: از نوزاد در بخش مراقبت های ویژه نوزادن مراقبت خواهد شد. (مانند اکسیژن درمانی، دارو درمانی، معاینه چشم پزشکی، تغذیه شیر با لوله کمکی(دهانی-معده ای) و .....)

## آیا از تغذیه مناسب برای "نوزادان نارس" اطلاع دارید؟

در ابتداشیر(مادر یا کمکی) در حجم کم با کمک لوله دهانی معده ای برای نوزاد شروع میشود و به تدریج حجم شیر افزایش می یابد. تمرين مکیدن با انگشت شست مادر یا سینه خالی انجام میشود و سپس با صلاح دید پزشك معالج تغذیه دهانی (وجود آمادگی مانند وجود صدای روده) با کمک فنجان یا سرنگ انجام میشود و در نهایت تغذیه زیر سینه مادر انجام می شود.

مهم ترین نکته در تغذیه نوزاد نارس:  
شروع تدریجی و محتاطانه شیر است

## می دانید چه داروهایی برای "نوزاد نارس" تجویز می شود؟

در بیمارستان سرم و داروهای آنتی بیوتیک با هدف جلوگیری از عفونت تجویز میشود و در صورت نیاز تغذیه وریدی، داروی تکمیل کننده رشد ریه و ویتامین و... طبق دستور پزشك استفاده می گردد.

۲

والدین گرامی، مطالب زیر جهت افزایش آگاهی شما در مورد بیماری فرزندتان می باشد لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

آیا میدانید به چه نوزادانی "نارس" گفته میشود؟  
نوزاد نارس به نوزادی گفته میشود که قبل از پایان هفته ۳۷ بارداری یا با وزن کمتر از ۲.۵ کیلوگرم (۲۵۰۰ گرم) متولد شود.

## شايع ترین علائم "نوزادان نارس" را ميشناسيد؟

۱. دور سر کمتر از ۳۳ سانتی متر، وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم، قد کمتر از ۴۸ سانتی متر
۲. شفاف، قرمز و شکننده بودن پوست، چربی زیر پوستی کم کوچک بودن پستان، شکم بر جسته
۳. کوتاه و باریک بودن دست و پا و بدن نحیف و ناخن ظرفی
۴. نرم و انعطاف پذیر بودن غضروف گوش خارجی
۵. دور سر کمتر از ۳۳ سانتی متر، وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم، قد کمتر از ۴۸ سانتی متر

## آیا از روش های تشخیص "نوزاد نارس" اطلاع دارید؟

- مشاهده علام بالینی (علائم ذکر شده در بالا)
- وزن هنگام تولد
- سن جنینی

## آیا از روش های درمانی بیماری "نوزادان نارس" اطلاع دارید؟

- قبل از تولد: کورتیکواستروئید درمانی حداقل ۴۸ ساعت پیش از تولد که منجر به کاهش شیوع خونریزی داخل حفره های قلب و سوراخ بین بطئی تجویز میشود.

۱