



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت



آموزش به بیمار



راهنمای دارویی

تهیه کنندگان:

خانمها: شیرین حشمتیان فر، صغری رفیعی، نسیمه مهربانی، لیلا شاه ملک پور، الهام شکاری، طاهره
مرجان، سارا رضائیا، لاله علیزاده، فرزانه حسین نژاد، معصومه حسن نیا

تحت نظارت:

سوپروایزر آموزش سلامت

فاطمه پوردقت کار

ویرایش: تیر ۱۴۰۳

بازنگری: مرداد ۱۴۰۳



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

فهرست		
ردیف	نام دارو	شماره صفحه
۱	اپی نفرین / Epinephrine	۷
۲	اریترو پو یتین / Erythropoietin (Epoetin alfa)	۷
۳	استامینوفن / Acetaminophen	۸
۴	امپرازول / Omeprazole	۹
۵	انالاپریل / Enalapril	۹
۶	اندانسترون / ondansetron	۱۰
۷	انسولین / Insulin	10
۸	ایبوپروفن / Ibuprofen	۱۱
۹	ایپراتروپیوم / Ipratropium Bromide	۱۲
۱۰	ایمونوگلوبولین وریدی / Immune Globulin Intravenous	۱۲
۱۱	اینفلکسیمب / Infliximab	۱۲
۱۲	آسیکلوویر / Acyclovir	۱۳
۱۳	آلوپورینول / Allopurinol	۱۳
۱۴	آمپی سیلین / ampicillin	۱۴
۱۵	آملودیپین / Amlodipine	۱۴
۱۶	آمیکاسین / Amikacin	۱۵
۱۷	آمینو اسید / Amino Acid	۱۵



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

فهرست		
ردیف	نام دارو	شماره صفحه
۱۸	اسلتامیویر / Osetamivir	۱۶
۱۹	باکلوفن / Baclofen	۱۶
۲۰	بودزوناید / Budesonide	۱۷
۲۱	پردنیزولون / Prednisolone	۱۷
۲۲	پرومتازین / promethazine	۱۸
۲۳	پنتوپرازول / Pantoprazole	۱۸
۲۴	ترازوسین / Terazosin	۱۹
۲۵	جنتامایسین / Gentamicin	۲۰
۲۶	دفرازیروکس / Deferasirox	۲۱
۲۷	دفروکسامین مزیلات / Deferoxamine Mesylate	۲۳
۲۸	دفروکسامین / Deferoxamine	۲۳
۲۹	دفریپرون / Deferiprone	۲۴
۳۰	دگزامتازون / Dexamethasone	۲۶
۳۱	دیازپام / Diazepam	۲۷
۳۲	رانیتیدین / Ranitidine	۲۷
۳۳	ریتوکسیمب / Rituximab	۲۸
۳۴	ریسپریدون / Risperidone	۲۸



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

فهرست		
شماره صفحه	نام دارو	ردیف
۲۹	Rifampin (Rifampicin) / ریفامپین	۳۵
۳۰	Zoledronic acid / زولدرونیک اسید	۳۶
۳۱	Salbutamol / سالبوتامول	۳۷
۳۲	Cimetidine / سایمتدین	۳۸
۳۲	Cetirizine / ستیریزین	۳۹
۳۳	Cefazolin / سفازولین	۴۰
۳۳	Cefepime / سفپیم	۴۱
۳۴	Ceftazidime / سفنازیدیم	۴۲
۳۴	Ceftriaxone / سفتریاکسون	۴۳
35	Ceftizoxime / سفتی زوکسیم	۴۴
35	Cefixime / سفکسیم	۴۵
۳۵	Cefotaxime / سفوناکسیم	۴۶
۳۵	Zinc sulfate / سولفات روی	۴۷
۳۶	Sulfacetamide sodium / سولفاستامید	۴۸
۳۷	Ciprofloxacin / سیپروفلوکساسین	۴۹
۳۸	Cyclophosphamide / سیکلوفسفاماید	۵۰
۴۰	Sevelamer / سیویلامر	۵۱



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

فهرست		
شماره صفحه	نام دارو	ردیف
۴۰	Furosemide / فورزماید	۵۲
۴۲	Phenobarbital / فنوباربیتال	۵۳
۴۳	Phenytoin / فنی توئین	۵۴
۴۶	Calcium carbonat / کلسیم کربنات	۵۵
۴۶	Clindamycin / کلیندامایسین	۵۶
۴۷	Co-Trimoxazole / کوتریموکسازول	۵۷
۴۸	Ganciclovir / گان سیگلوویر	۵۸
۴۹	Cloxacillin / کلوکزاسیلین	۵۹
۴۹	levetiracetam / لوتیراستام	۶۰
۵۰	Metronidazol / مترونیدازول	۶۱
۵۱	Metoprolol succinate / متوپرولول سوکسینات	۶۲
۵۱	Methylprednisolone / متیل پردنیزولون	۶۳
۵۲	Meropenem / مروپنم	۶۴
۵۲	Mometasone / مومتازون	۶۵
۵۳	Montelukast / مونته لوکاست	۶۶
۵۴	Midazolam / میدازولام	۶۷
۵۴	Valproate sodium / والپرات سدیم	۶۸



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

فهرست		
شماره صفحه	نام دارو	ردیف
۵۵	ونکومايسين / vancomycin	۶۹
۵۶	ویتامین k/k Vitamin	۷۰
۵۷	ویتامین ث / Vitamin C (Ascorbic Acid)	۷۱
۵۸	هپارین سدیم / Heparin sodium	۷۲
۵۹	هیدروکسی اوره / Hydroxyurea	۷۳
۵۹	هیدروکسی زین / Hydroxyzine	۷۴
۶۰	هیدروکورتیزون / hydrocortisone	۷۵
۶۱	یوموگی / yomogi	۷۶



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۱	اپی نفرین / Epinephrine	۱%	Epitrate Adrenalin	آمپول: آژیته شدن، سردرد، سرگیجه، توهم، بی خوابی، هیپرتانسیون، تهوع، استفراغ، تاری دید، آینه چشمی: سوزش موقتی، درد چشم، پر خونی ملتحمه، تحریک چشم	شرایط نگهداری قطره چشمی: در - درجه حرارت اتاق و دور از نور نگهدارید. - قطره در پلک تحتانی ریخته شود و از ریختن قطره روی قرنیه اجتناب شود. نوک قطره چکان با چشم یا سطح دیگری تماس پیدا نکند. - در تزریق عضلانی و زیرجلدی قبل از استفاده دارو را تکان دهید و بعد از تزریق محل را ماساژ دهید. - بعد از استنشاق دارو به منظور برطرف کردن خشکی دهان، آن را شستشو دهید.
		قطره چشمی			
		آمپول 1mg/1 cc 0.1mg/ml(10cc)			
۲	اریتروپویتین / Erythropoietin (Epoetin alfa)	۱۰,۰۰۰-۴۰۰۰-۲۰۰۰ واحد	-Epogen Procrit- PDPoetin Eprex	تشنج، سردرد، سرگیجه، افزایش فشارخون، کهیر، اسهال، سرفه	در صورت بروز درد و تورم در محل تزریق زیرجلدی اطلاع دهید.
		آمپول			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۳	استامینوفن / Acetaminophen		Tylenol/Datril Apotel	گیجی - خواب آلودگی - خارش - راش - کهیر - اریتم - تهوع، اسهال و استفراغ - درد شکم - کهیر، خارش، زخم دهان، کاهش حجم ادرار، ادرار کدر، لکونی، کاهش قند خون، سمیت کبدی	- شرایط نگهداری شیف: در درجه حرارت کمتر از ۲۷ درجه سانتیگراد. - بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید در غیر این صورت ممکن است آسیب کبدی ایجاد شود. - علائم مصرف بیش از حد دارو شامل: تهوع و استفراغ، و درد شکمی. - در درمان های طولانی مدت توجه به مواردی از قبیل ادرار تیره، مدفوع بی رنگ، پوست و صلیبه زرد رنگ، خارش، درد شکمی، تب و اسهال و در صورت واکنش آلرژیک مثل راش و کهیر، دارو قطع شود.
	آپول	1gr/100ml 150 mg/ml(6.7cc)			
	شریت	120mg/5cc			
	قرص	125-325-500 mg			
	شیاف	125-325 mg			
	قطره	100 mg / cc			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۴	کپسول امپرازول / Omeprazole	20mg	Prilosec Losec	سردرد، بی خوابی، اسهال، راش، تکرر ادرار	– دارو را قبل از غذا مصرف نماید. تا ۱ ساعت بعد از مصرف دارو لبنیات مصرف نشود. – از جویدن و باز کردن کپسول اجتناب شود.
۵	قرص انالاپریل / Enalapril	mg- 5mg - 10mg- ۲/۵20mg	Vasotec	سرگیجه، سردرد، درد قفسه سینه	– دارو می تواند سبب گیجی، غش، احساس سبکی در سر خصوصاً روز های اول درمان گردد. – از تغییر وضعیت ناگهانی به دلیل افت فشار ناگهانی بپرهیزید. – دارو را ناگهانی قطع نکنید. – از مصرف داروهای ضد سرفه و سرماخوردگی و آلرژی اجتناب کنید مگر آنکه طبق دستور پزشک باشد. – به منظور پیشگیری از حساسیت نسبت به نور آفتاب، از ضد آفتاب استفاده کنید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
					در صورت بروز زخم دهانی، گلو درد، تب، تورم دست ها یا پاها، ضربان نامنظم قلب، درد قفسه سینه به پزشک اطلاع دهید.
۶	آندانسترون / ondansetron	4mg/2ml	Zofran Demitron	سردرد، سرگیجه، راش، احتباس ادرار، اسهال، درد شکم، فلبیت، درد قفسه سینه، درد عضلانی، یبوست	در هنگام تزریق به واکنش های افزایش حساسیت مثل راش و برونکواسپاسم دقت کنید. اسهال، یبوست، راش و تغییر در تنفس را گزارش کنید.
		آمپول			
		قرص			
		شربت			
۷	آمپول انسولین / Insulin	100IU/ml	Lansulin	هیپوگلیسمی، هیپرگلیسمی، گرمی در محل تزریق، لیپوآتروفی، خارش، آنافیلاکسی، تاری دید و خشکی دهان	نگهداری: ویال و قلم انسولین که استفاده نمی شود در درب یخچال و انسولینی که باز شده در دمای طبیعی اتاق و تا یک ماه قابل نگهداری است. دارو در معرض نور و گرما قرار نگیرد. از تزریق انسولین سرد اجتناب شود.
		ویال قلم			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۸	ایبوپروفن / Ibuprofen		Brufen/Advil	سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، ضعف، هیپو تانسیون و طپش قلب، تهوع، اسهال، استفراغ، یبوست، درد اپی گاستر (GIB خونریزی اپی گاستر)، راش، وزوز گوش، اختلال دید	<p>– شرایط نگهداری: دارو در دمای ۱۵-۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.</p> <p>– موارد تاری دید و وزوز گوش را گزارش کنید زیرا می تواند علائم مسمومیت دارویی باشد.</p> <p>– به منظور کاهش نشانه های گوارشی دارو را با غذا یا شیر یا آنتی اسید مصرف کنید و در صورت بروز تهوع و استفراغ به پزشک اطلاع دهید.</p> <p>– از آنجایی که احتمال بروز خونریزی وجود دارد همراه با NSAID و سالیسیلات مصرف نکنید.</p>
	شربت	۱۰۰mg/5cc			
	قرص	200- 400mg			
	کپسول	200- 400mg			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۹	ایپراتروپیوم / Ipratropium Bromide	۲۰-۴۰ mcg/dose	Atrovent/ Itrop	دیسترس گوارشی، تهوع، خشکی دهان، سرفه، سردرد، سرگیجه، راش	<p>- قبل از به کارگیری اسپری را به خوبی تکان دهید.</p> <p>- برای برطرف شدن خشکی دهان از آب نبات، آدامس بدون قند و نوشیدن جرعه آب استفاده کنید.</p> <p>- برای استفاده از اسپری حتماً از دمپار استفاده نمایید.</p>
	استنشاقی (Inhaller)	۲۵۰ mcg/ml (1ml-2ml)			
	نبولایزر				
۱۰	ایمونوگلوبولین وریدی / Immune Globulin Intravenous	2/5gr-5gr	Intratect	تعریق، سرگیجه، کاهش فشار خون، سردرد، تهوع، افزایش ضربان قلب، آنافیلاکسی	<p>- در صورت بروز عوارض بلافاصله دارو قطع شود و به پزشک اطلاع دهید.</p> <p>- سرعت انفوزیون آهسته و با کنترل علائم حیاتی انجام می شود.</p>
۱۱	اینفلکسیمب / Infliximb	۱۰۰mg : تزریقی (پودر)	Remicade	افسردگی، سردرد، زخم دهانی، استفراغ، لکوپنی، آنمی، نوتروپنی، پانسیتوپنی، درد سینه، هایپو و هایپر تانسیون و کوئزکتیویت و دیس اوری، تشنج، تاکیکاردی، آنافیلاکسی	<p>نگهداری: دارو را در یخچال نگهداری کنید و آن را منجمد نکنید.</p> <p>- به صورت دوره ای CBC Diff و تستهای خونی انجام دهید.</p>



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
					<p>وضعیت قلبی، نبض و فشارخون را بررسی کنید.</p> <p>در صورت بروز واکنش های آلرژیک دارو را قطع و به پزشک اطلاع دهید.</p>
۱۲	آسیکلوویر / Acyclovir		Zovirax	<p>سرگیجه، افت فشار، راش، سوزش گذرا، اسهال، تهوع و استفراغ، فلیبت، درد مفاصل</p>	<p>- نگهداری: ظروف مقاوم به نور، و درجه حرارت ۳۰-۱۵.</p> <p>- قرص همراه غذا یا با معده ی خالی مصرف کرد.</p> <p>- مخلوط کردن دارو با شیر باعث کاهش تاثیرات آن می شود.</p>
	آمپول	250mg-500mg			
	قرص	200mg-400mg			
	کرم موضعی	۵%			
	کرم استریل چشمی	۳%			<p>- مراقبت بهداشتی دندان در طول درمان جهت پیشگیری از بروز هیپرپلازی لثه</p>
۱۳	قرص آلوپورینول / Allopurinol		Zyloprim-Aloprim	<p>سردرد، راش، سندرم استیونسی جانسون، تهوع و استفراغ، احساس طعم فلز در دهان، تب، لرز، آنمی</p>	<p>- نگهداری: ظرف دربسته، دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد.</p> <p>- دارو بعد از غذا مصرف شود.</p>
		100mg-300mg			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
				آپلاستیک، ترومبوسیتوپنی	در طی درمان از غذاهای قلیایی استفاده کند زیرا اسیدی شدن ادرار احتمال ایجاد سنگهای کلیوی را افزایش می دهد و مصرف مایعات باید افزایش یابد.
۱۴	آمپی سیلین ampicillin		Ampi-Omnipen	تشنج (در دوزهای بالا)، اسهال، راش، فلبیت، کاهش ادرار	در صورت ایجاد علائم عفونت ثانویه (برجستگی های خزه مانند بر روی زبان، خارش، مدفوع شل و متعفن) و آلرژی به پزشک اطلاع دهید. قرص را می توان خرد کرد و کپسول را باز کرد و با آب مخلوط کرد.
	آمپول	250mg-500mg-1gr			
	سوسپانسیون	125 mg/5ml-250mg/5ml			
	کپسول	250mg-500mg			
۱۵	قرص آملودیپین / Amlodipine	5 mg-10mg	Norvasc/Amolara-Istin	سردرد، سرگیجه، طپش قلب، ادم محیطی یا صورت، آریتمی، تهوع، درد شکم، خارش، تنگی نفس، درد عضلانی، تشنگی، وزوز گوش، درد قفسه سینه.	- شرایط نگهداری: در ظرف در بسته. - در صورتی که مصرف دارو در یک نوبت فراموش شود به هیچ عنوان در نوبت بعدی دوز آن را دو برابر نکنید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
					<p>– از مصرف خود سرانه دارو و مصرف گریپ فروت خودداری نمایید.</p> <p>– از تغییر وضعیت ناکهانی بپرهیزید.</p> <p>– جهت جلوگیری از بروز بیماری های لته، بهداشت دهان را رعایت کنید.</p>
۱۶	آمپول آمیکاسین/Amikacin	100mg/2CC 500mg/2cc	Amikin	سردرد، سمیت گوش (وزوز گوش، سرگیجه، کاهش شنوایی)، الیکوری، پروتئینوری، تشنج، نکروز کبدی، آنمی، لوکوپنی	<p>در صورت علائمی مانند حساسیت مفرط، وزوز گوش، سرگیجه و کاهش شنوایی را به پزشک اطلاع دهید.</p>
۱۷	آمینو اسید/Amino Acid	سرم ۱۰% سرم 5%	Aminoven برای نوزادان Aminess	سردرد، سرگیجه، کاهش هوشیاری، تهوع و استفراغ، ادم ریوی، پرفشاری خون، درد شکمی، لرز، فلبیت در محل تزریق	<p>– هر گونه لرز و تورم باید گزارش کنید.</p> <p>– بهداشت دهان را رعایت کنید.</p> <p>– با مصرف دارو ممکن است حرکات روده کند و مزه و طعم غذا</p>



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات	
					در دهان احساس شود که عادی می باشد.	
۱۸	اسلتامیویر / O Seltamivir		Tamiflu	سردرد، سرگیجه، خستگی، هذیان، تشنج، سندرم استیونسی، جانسون، تهوع، استفراغ، درد شکمی، سرفه	<p>—در ظرف محکم و خشک نگهداری شود.</p> <p>—در صورت ایجاد سرگیجه از فعالیتهای خطرناک خودداری شود.</p> <p>—در صورت ایجاد راش پوستی، هذیان و سایکوز دارو قطع شده و به پزشک اطلاع داده شود.</p> <p>— برای کاهش علائم گوارشی با غذا مصرف شود.</p> <p>—حداقل ۴ ساعت قبل از خواب مصرف شود تا ایجاد بیخوابی نکند.</p> <p>—سوسپانسیون خوراکی بعد از آماده شدن تا ۱۰ روز در دمای اتاق و ۱۷ روز در یخچال قابل نگهداری</p>	
		۳۰ mg-45mg-75mg				کپسول
		12mg/ml				سوسپانسیون



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات	
					میباشد.	
۱۹	Baclofen/ باکلوفن	۱۰mg-25 mg	Liorsesal	سرگیجه، سردرد، طپش قلب، درد قفسه سینه، دو بینی، وزوزگوش، تهوع، استفراغ، درد شکم، شب ادراری، افزایش وزن، خارش، دفع دردناک ادرار	<ul style="list-style-type: none"> به هیچ عنوان دارو را ناگهانی قطع نکنید چون این دارو باید ظرف ۱-۲ هفته تدریجاً قطع گردد. جهت کاهش عوارض گوارشی با غذا میل شود. این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی شود و بعد از مصرف دارو از انجام فعالیت های خطرناک و تغییر ناگهانی وضعیت پرهیز نمایید. 	
۲۰	Budesonide / بودزوناید	100mg و 400mg	Pulmicort- Rhinocort	سردرد، ایستاکسی، گرفتگی صدا، تحریک بینی، کاهش حس بویایی، تهوع، خشکی دهان، استفراغ، فارنژیت، میالژی.	<ul style="list-style-type: none"> شرایط نگهداری: در درجه حرارت ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداشته و دور از گرمای زیاد باشد. به منظور کاهش غلظت ترشحات، روزانه ۲ لیتر مایعات مصرف شود. به منظور برطرف شدن خشکی 	
		64mcg/dose				



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	NEB	0/5 mg/2cc 1 mg/2cc			محیط میزان رطوبت محیط را افزایش دهید. - در صورت بروز بی خوابی، گیجی، نبض نامنظم و خونریزی از بینی و فارتژیت به پزشک معالج اطلاع دهید.
۲۱	قرص پردنیزولون Prednisolone/	5mg-50mg	Pediapred- Flopred	بی خوابی، ادم، تاخیر در بهبود زخم، برفک، سرکوب سیستم ایمنی، درد استخوان-خونریزی گوارشی-پانکراتیت-افزایش اشتها	- نگهداری: به دور از نور و دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد. - جهت پیشگیری از تحریک معده دارو همراه غذا میل شود. - دارو درست طبق دستور پزشک مصرف شود و به یکباره قطع نشود. - در صورت مدفوع قیری، درد شدید شکم سریعاً به پزشک اطلاع دهید.
۲۲	پرومتازین / promethazine		Pentazine, Phenazine	سرگیجه، بی قراری، خشکی دهان، حساسیت به نور، احتقان بینی، ضایعات	- احتباس ادراری یا تکرر و سوزش زمان دفع ادرار چک شود.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	آمپول	۲۵ mg/ml		پوستی-تاری دید-وزوز گوش	- از تماس طولانی مدت با آفتاب خودداری شود. - حرکات غیر ارادی و تب و گلودرد گزارش شود.
	قرص	۲۵ mg			
	شربت	۵ /mg۵ ml			
۲۳	پنتوپرازول / Pantoprazole		Pantozol	اضطراب، سردرد، بی خوابی، درد شکمی، یبوست، اسهال، راش، برونشیت، افزایش سرفه	- اگر مبتلا به دیابت هستید ممکن است دچار هیپوگلیسمی شوید. - قرص را خرد نکنید و به صورت کامل میل نمایید. - این دارو همراه غذا، قبل یا بعد غذا میل نمایید. - در صورت اسهال شدید، دارو قطع شود.
	آمپول (ویال)	40 mg			
	قرص	20 mg -40 mg			
	کپسول	15 mg -20 mg -40 mg			
۲۴	ترازوسین / Terazosin		Hytrin	عصبانیت، تاری دید، احتقان بینی، طپش قلب، افت فشارخون وضعیتی،	- بعد از مصرف اولین دوز دارو احتمال غش وجود دارد لذا تا ۴



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	قرص	2-5-10mg		تنگی نفسی، تهوع، سرگیجه، سردرد	ساعت بعد از دریافت دوز اول یا افزایش میزان دوز قبلی از رانندگی و کار با ماشین آلات پرهیزید. -بهرتر است اولین دوز را هنگام خواب مصرف نمایید. -به دلیل افت فشارخون وضعیتی بهتر است از حالت نشسته با ایستاده به آهستگی تغییر وضعیت دهید.
۲۵	جنتامایسین / Gentamicin		Garamycin	سردرد، اسهال، حساسیت، دپرسیون تنفسی، حساسیت نور، مسمومیت کلیه، هماچوری، الیکوری، آسیب شنوایی، تشنج، لوکوپنی، ترومبوسیتوپنی	-شرایط نگهداری: دارو دور از نور و درجه حرارت ۳۰-۱۵ -بررسی عملکرد شنوایی قبل و حین و بعد از درمان و توجه به مواردی از قبیل صدای زنگ و غرش در گوش و سرگیجه. -مصرف مایعات ۳ تا ۲ لیتر در روز
	آمپول	۲۰mg/۲cc- ۴۰ mg/۲cc- ۸۰ mg/2cc			
	قطره	3 mg/cc			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	پماد	3 mg/g			جهت جلوگیری از آسیب کلیوی. -قطره داخل کیسه پلک تحتانی چکانده شود و سپس بر گوشه داخلی چشم فشار ملایم آورده شود تا از جذب سیستمک دارو پیشگیری شود.
۲۶	دفراسیروکس / Deferasirox	250-500Mg-قرص125:قرص (قرص برای سوسپانسیون خوراکی)	اسورال / Osveral Jedna نانوجید الیجید تالاجید اکسجید	تهوع و استفراغ، اسهال، نفخ، یبوست، کاهش مقدار ادرار، راش و بثورات پوستی شدید، تنگی نفس، گیجی و تورم در صورت و حلق، راش و یا قرمزی پوست، تاول در لب، پوسته پوسته شدن و سوزش در گلو، درد در	- اسورال را یک بار در روز و هر روز راس ساعت مشخص مصرف نمایید. - قرص را با معده خالی (۳۰ دقیقه قبل از غذا) میل نمایید. - قرص را به صورت کامل درون یک لیوان آب یا آب پرتقال



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهر بزرگ رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
				<p>ناحیه راست و بالای شکم، زردی پوست و چشم، استفراغ خونی به صورت مشاهده ذرات شبیه دانه های قهوه در استفراغ یا مدفوع تیره، درد قفسه سینه، ناری دید، استفراغ، اسهال، کاهش قدرت شنوایی، ترمبوسیتوپنی، پانسیتوپنی.</p>	<p>بیندازید. برای دوز های کمتر از ۱ گرم، از ۱۰۰ سی سی و برای دوز های ۱ گرم و بیشتر از ۲۰۰ سی سی آب یا آب پرتقال استفاده شود.</p> <p>– محتویات لیوان را به خوبی به هم بزنید تا یک سوسپانسیون یکنواخت ایجاد شود. مخلوط نهایی کدر خواهد بود.</p> <p>– در صورتی که اسورال بیشتر از مقدار تجویز شده مصرف شده باشد یا شخص به اشتباه از این دارو مصرف کرده باشد، فرد باید بلافاصله به همراه جعبه دارو، به پزشک یا بیمارستان مراجعه نماید.</p> <p>– دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.</p>



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۲۷	دِفروکسامین مزيلات / Deferoxamine Mesylate	آمپول: ۵۰۰ میلی گرم	دسفوناک / Desfonak	<ul style="list-style-type: none"> واکنش بدن به محل تزریق (سوزش و درد در ناحیه تزریق، تورم، تغییر رنگ پوست) تار شدن دید سرگیجه وزوز گوش بثورات پوستی شامل خارش ناراحتی معده اسهال و تهوع رنگ قرمز ادرار (ناشی از شلات آهن) 	<ul style="list-style-type: none"> محلول حاصله باید شفاف و بیرنگ تا زرد کم رنگ باشد. در صورت وجود کدورت یا ذره در محلول از مصرف آن خودداری شود. گاهی اوقات مصرف دارو در برخی از بیماران رنگ ادرار قرمز می شود. دارو دور از گرما و نور مستقیم نگهداری شود. دارو در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
۲۸	دِفروکسامین / Deferoxamine	ویال ۵۰۰ میلی گرم	دسفرال / Desferal	<ul style="list-style-type: none"> محل تزریق: درد، تورم، سوزش، تغییر رنگ پوست تار شدن دید، سرگیجه، صدای زنگ در گوش، احساس گرما، بثورات پوستی شامل: خارش، احساس بی 	<ul style="list-style-type: none"> تزریق از راه وریدی و زیرجلدی و عضلانی انجام می شود. متداول ترین روش زیرجلدی با کمک پمپ انفوزیون دسفرال است. دسفرال در بیماران شدید کلیوی یا آنوریا منع مصرف دارد زیرا دارو



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
				حسی یا درد، اسهال، تهوع، ناراحتی معده، رنگ قرمز ادرار (ناشی از شلات آهن)	و شلات آهن به طور عمده از طریق کلیه دفع می شود. - بیمارانی که دچار سرگیجه یا سایر اختلالات سیستم عصبی یا اختلال در بینایی یا شنوایی هستند باید از رانندگی یا کار با ماشین های خطرناک خودداری کنند. - در مورد زنان باردار فقط در صورت احساس خطر احتمالی برای مادر و نوزاد در صورت افزایش آهن استفاده می شود.
۲۹	دفریپرون / Deferiprone	قرص: ۵۰۰ میلی گرم	Ferriprox (فریپروکس)، آوی دفرون	- گوارشی (تهوع و استفراغ)، کاهش گلبول سفید، درد شکمی، آگرانولوسیتوز و نوتروپنی، افزایش گذرا در آنزیم های کبدی، کمردرد، درد مفاصل، اسهال، تب، گلو درد.	- در صورت بروز هر یک از عوارض نام برده شده دارو قطع شود و به پزشک اطلاع دهید. - مقدار مصرف را پزشک تعیین می کند. مقدار توصیه با توجه به آزمایش های انجام شده و تعیین



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
					<p>میزان آهن آزاد، ۷۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز می باشد که این مقدار دارو در ۳ دوز منقسم مصرف گردد.</p> <p>– قرص را به طور کامل بلعیده و از شکستن، جویدن و یا نصف کردن آن خودداری کنید.</p> <p>– منع مصرف: در بیمارانی که سابقه اگرنولوسیتوز یا نوتروپنی برگشت پذیر دارند و در بارداری و در شیردهی مصرف نشود.</p> <p>– در صورت اشکال در کارکرد کبد و کلیه این دارو با احتیاط مصرف شود.</p>



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۳۰	دگزامتازون / Dexamethasone		Topidex	بی خوابی، سر درد، ادم، تاخیر در بهبود زخم، برفک، افزایش اشتها، سرکوب سیستم ایمنی، افزایش احتمال عفونت، ضعف، تشنج، خونریزی دستگاه گوارشی، پانکراتیت	<p>– نگهداری: ۳۰C-۱۵.</p> <p>– داروی خوراکی همراه غذا میل شود.</p> <p>– به هیچ عنوان بدون نظر پزشک قطع نشود.</p> <p>– رژیم غذایی غنی از پرتئین، کلسیم، پتاسیم (سدیم و کربوهیدرات محدود) مصرف شود.</p> <p>– از تماس با افراد مبتلا به بیماریهای واگیر شناخته شده پرهیز نمایید.</p> <p>– در صورت بروز درد شدید شکمی، سیاه و قیری شدن مدفوع و تورم غیرعادی، افزایش وزن به پزشک گزارش نمایید.</p>
	آمپول	8 mg/2cc			
	قرص	0.5 mg			
	شربت	0.5 mg/5cc			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۳۱	دiazepam / دیازپام	10mg/2ml	Diazemuls	سرگیجه، سردرد، افسردگی، خستگی، ناکیکاردی، یبوست، بی اشتها، راش پوستی، تاری دید، اختلال عملکرد کبدی، تضعیف مرکز تنفس- افت فشار خون-خواب آلودگی	- می توان دارو را همراه غذا مصرف نمود. - بعد از یک دوره ی طولانی مدت دارو را ناگهانی قطع نکنید. - در ابتدای درمان ممکن است خواب آلودگی بدتر گردد.
		قرص			
		2- 5- 10 mg			
		5- 10 mg			
۳۲	Ranitidine / رانیتیدین	150mg 300mg	Zantac	ضعف، سرگیجه، سردرد، راش، یبوست، سوزش و خارش محل تزریق، تاری دید، پنومونی	- نگهداری: ظرف دربسته، محل خشک و دمای C ۳۰-۱۵. - مصرف دراز مدت باعث کمبود ویتامین B12 می شود. - اشتقاق دود سیگار در دوره ی درمان اثر دارو را دچار اختلال میکند. - در صورت ایجاد سرگیجه و خواب آلودگی، تیرگی یا قیری رنگ شدن مدفوع، راش به پزشک اطلاع دهید.
		قرص			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهر بزرگ رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
					<p>ادراری چک کنید.</p> <p>– از آنجا که ممکن است هیپوتانسیون وضعیتی رخ دهد به آهستگی تغییر وضعیت دهید.</p> <p>– از گرفتن دوش آب داغ اجتناب کنید زیرا احتمال بروز هیپوتانسیون وجود دارد.</p> <p>اختلال در بینایی، لرزش و درد عضلانی را گزارش دهید.</p> <p>– از توقف در هوای گرم خودداری نمایید ممکن است گرمزدگی رخ دهد.</p>
۳۵	ریفامپین / Rifampin (Rifampicin)		Rifadin/Rimactane	سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، کاهش اشتها، تهوع، اسهال و استفراغ، یبوست، نفخ، لکونی، راش و اختلال دید، هماچوری، پانکراتیت، نارسایی	<p>– شرایط نگهداری: دارو در درجه حرارت ۱۵-۳۰ درجه سانتیگراد و دور از رطوبت نگهداری شود.</p> <p>– طی درمان باید شیردهی قطع شود.</p>
	قطره	۱۵۳ mg/cc			
	آمپول	۶۰۰ mg			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	کپسول شریت	۱۵۰-۳۰۰ mg 20mg/ml		حاد کلیه، زخم دهان و زبان، سندرم استیونس جانسون	– دارو را با یک لیوان پر از آب و با معده خالی یک ساعت قبل از غذا یا ۲ ساعت بعد از غذا مصرف کنید. – در صورت بروز استفراغ قبل از مصرف دارو از داروهای ضد استفراغ استفاده نمایید. – حین مصرف دارو ممکن است رنگ ادرار، مدفوع، بزاق، مخاط، تعریق و اشک به نارنجی قرمز تغییر کند.
۳۶	زولدرونیک اسید/ Zoledronic acid	تزریقی (آمپول): 4mg/5ml	زولنا / Zolena	– تهوع، استفراغ، خستگی و ضعف، تب، کم خونی، یبوست، اسهال، درد استخوان و مفاصل، درد عضلانی، بی اشتها، کاهش وزن، ورم پا، کمر درد، سردرد، بی خوابی، سرفه، تنگی نفس و درد شکمی، افت فشار خون، ادم	– بیماران بایستی روزانه ۵۰۰ میلی گرم کلسیم خوراکی به همراه ۴۰۰ واحد ویتامین D به شکل مکمل مصرف کنند. – مصرف در زنان در سنین باروری هم توصیه نمی شود چون احتمال



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهر بزرگ رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
				پا	آسیب به جنین وجود دارد. - به دلیل احتمال ترشح این دارو در شیر و احتمال ایجاد عوارض برای نوزاد، این دارو در مادران شیرده نبایستی مصرف شود. در صورت داشتن سابقه حساسیت به این دارو، داروهای مشابه و یا مواد نگهدارنده، این موضوع حتماً به پزشک اطلاع داده شود.
۳۷	سالبوتامول/Salbutamol	قرص	Ventolin Ventalex salbutrex	بیقراری، سرگیجه، تپش قلب، تهوع و استفراغ، خشکی دهان، سرفه، تنگی نفس، افزایش خلط، خشکی و تحریک گلو	- نگهداری: قرص و شربت را در ظروف دربسته و مقاوم به نور در دمای اتاق. - کودکان سنین ۶-۲ سال به بروز تحریک CNS (بی خوابی، بیقراری)، تاکیکاردی و علائم گوارشی حساس ترند. - در صورت بروز بی خوابی به دنبال مصرف دارو آخرین دوز
		2mg			
		2mg/5CC			
		شربت			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهر بورت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	بخور	2.5mg/2.5ml			سالیونامول را چند ساعت قبل از خواب تجویز نمایید.
	اسپری	100mcg/dose			
۳۸	سایمتیدین / cimetidine		Tagamet Apo-cimetidine	سردرد، سرگیجه، اسهال، راش، کهیر، یرقان، اضطراب، لرزش، تشنج، آنمی	<ul style="list-style-type: none"> - دارو در دمای ۳۰-۱۵ درجه نگهداری شود. - از مصرف فلفل سیاه، الکل، کافئین اجتناب کنید. - از داروهای ضدسرفه و سرما خوردگی مصرف نکنید. - تا زمان تطبیق دارو با بدن رانندگی و کار خطرناک نکنید.
	آمپول	200 mg/2 cc			
	قرص شربت	200 mg 200mg/5ml			
۳۹	ستیریزین / cetirizine		zyrtec	خشکی دهان، سرفه، ضعف، بی خوابی، سرگیجه، حساسیت به نور	<ul style="list-style-type: none"> شرایط نگهداری: - در درجه حرارت ۱۵-۳۰ درجه سانتیگراد. - دارو بدون توجه به وعده های
	قرص	5-10mg			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	شربت	5mg/5cc (60 cc)			غذایی مصرف شود. - به منظور برطرف شدن خشکی دهان از آب نبات، آدامس و نوشیدن جرعه های آب استفاده کنید. - دارو را در ظرف دربسته و مقاوم به نور نگهدارید. - این دارو طی شیردهی مصرف نمی شود.
	کپسول	10 mg			
۴۰	آمپول سفازولین / Cefazolin	250mg-500mg-1gr	Kefzol	سر درد، سرگیجه، خارش، تهوع، اسهال، حساسیت، خارش ناحیه تناسلی، کهیر و راش	در صورت بروز علائم عفونت ثانویه (ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل) و آلرژی به پزشک اطلاع دهید.
۴۱	سفپیم / Cefepime		Maxipime	تب، سردرد، فلبیت، تهوع، استفراغ، راش، کهیر، گانگدید یازیس دهانی	- اطلاع به پزشک در صورت بروز کلودرد، خونریزی و درد مفاصل،



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	آمپول	500 mg-1gr -2gr			کبودی، اسهال همراه با مخاط یا خون. - دارو در زمان مشخص مصرف شود.
۴۲	سفتازیدیم/ceftazidime	500 mg-1gr-2gr	Tazicef-Fortaz	سردرد، سرگیجه، خارش، تهوع، اسهال، حساسیت، خارش ناحیه تناسلی، کهیر و راش	در صورت بروز علائم عفونت ثانویه (ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل) و آلرژی به پزشک اطلاع دهید.
۴۳	سفتریاکسون / ceftriaxone	250 mg-500 mg-1 gr	Rocephin	سردرد، سرگیجه، خارش، تهوع، اسهال، حساسیت، خارش ناحیه تناسلی، کهیر و راش	در صورت بروز علائم عفونت ثانویه (ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل) و آلرژی به پزشک اطلاع دهید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۴۴	سفتی زوکسیم / Cefprozime	500 mg-1gr	Cefprozox	سردرد، سرگیجه، خارش، تهوع، اسهال، حساسیت، خارش ناحیه تناسلی، کهیر و راش	در صورت بروز علائم عفونت ثانویه (ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل) و آلرژی به پزشک اطلاع دهید.
۴۵	سفسسیم / Cefixime	100mg/5CC	Suprax	سردرد، سندرم استیون-جانسون، کولیت، اسهال، خارش ناحیه ی زینتال، تب دارویی	– هر روز در ساعت معین از روز یا شب دارو را مصرف نماید.
	سوسپانسیون	200mg-400mg			– در صورت بروز تب و اسهال به خصوص در صورتی که حاوی خون، موکوس و چرک باشد به پزشک مراجعه نماید.
	قرص				
۴۶	سفوتاکسیم / cefotaxime	500mg-1gr	Claforan	سردرد، سرگیجه، خارش، تهوع، اسهال، حساسیت، خارش ناحیه تناسلی، کهیر و راش	در صورت بروز علائم عفونت ثانویه (ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل) و آلرژی به پزشک اطلاع دهید.
۴۷	سولفات روی / Zinc sulfate	220 mg	Verazinc	درد شکم، تهوع، اسهال و استفراغ	نکهداری: در دمای ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد
	کپسول				– دارو را همراه غذا مصرف



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	شربت	5mg/5ml			کنید و همراه با فرآورده های لبنی استفاده نشود. —در صورت استفاده از تتراسیکلین باید دو ساعت میان آنها فاصله باشد. موارد زیر سریعاً گزارش کنید: تهوع، استفراغ شدید، درد شکم، مدفوع قیری رنگ و راش.
۴۸	قطره سولفاستامید / sulfacetamide sodium	قطره چشمی ۱۰٪ یا ۲۰٪	Bactimide 10% Cetamide	تاری دید، سوزش چشم، سر درد، پرخونی چشم	—تا زمان بهبودی کامل استفاده کنید. —دارو در قسمت تحتانی پلک ریخته و به مدت ۲ دقیقه برای جذب بهتر ناحیه کانتوسی (گوشه چشم) چشم فشار داده دهید. —در صورت تیره شدن رنگ محلول مصرف نکنید. —در صورت عدم بهبودی در عرض ۷ یا ۸ روز به پزشک مراجعه کنید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات	
					در درجه حرارت ۱۵-۸ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.	
۴۹	سیپرو فلوکساسین / Ciprofloxacin	۲۵۰-۵۰۰mg	Cipro/Ciproxin	سردرد، سرگیجه، بی قراری، آناکسی، تشنج، تهوع، اسهال، استفراغ، راش، خارش، کهیر، فلاشینگ، خونریزی گوارشی، کاندیدیازیس دهانی	<p>– شرایط نگهداری: دارو در درجه حرارت ۱۵-۳۰ درجه نگهداری شود.</p> <p>– از مصرف آنتی اسید، آهن، روی، کلسیم ۲ ساعت قبل و ۲ ساعت بعد از دارو خودداری شود.</p> <p>– طی مصرف دارو مصرف غذاهای قلیایی نظیر شیر و فراورده های لبنی و آنتی اسید های قلیایی و سدیم بیکربنات محدود شوند.</p> <p>– مصرف مایعات تا ۳ لیتر در روز به دلیل کاهش اثرات کلیوی آن افزایش یابد.</p>	
		قرص				
		۱۰ mg /1cc				آمپول (۲۰ سی سی)
		2 mg /1cc				محلول (انفوزیون ۱۰۰ سی سی)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
					<p>قطره داخل کیسه پلک تختانی چکانده شود و سپس بر گوشه داخلی چشم فشار ملایم آورده شود تا از جذب سیستمک دارو پیشگیری شود.</p>
۵۰	سیکلو فسفاماید / Cyclophosphamide		Endoxan-neosar	<p>ترومبوفلیت، لکوپنی، اسهال و استفراغ سمیت کلیوی، تب و ترومبوسیتوپنی</p>	<p>نکهداری: ظرف در بسته، دمای ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد -ایزولاسیون معکوس رعایت کنید. -هر گونه تغییر در سرفه و یا تنفس را گزارش کنید. -روزانه دهان خود را از نظر خونریزی، نقاط سفید و زخم دهانی گزارش کنید.</p>
	تزریقی (پودر)	200-500 Mg			
	قرص	۵۰ Mg			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
					<p>–علائم عفونت مانند افزایش درجه حرارت، گلو درد، نشانه های آنفلوآنزا را به اطلاع پزشک برسانید.</p> <p>–طی درمان ریزش مو ممکن است رخ دهد.</p> <p>–از مصرف غذاهای حاوی اسید سیتریک (مانند پرتقال، لیمو، لیمو شیرین..) و داغ و یا سفت خودداری نمایید.</p> <p>–از ایوپروفن و آسپرین استفاده نکنید.</p>



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۵۱	سیویلامر / Sevelamer		Renagel	عفونت، درد، افت فشارخون، اسهال، سوء هاضمه، تهوع و استفراغ.	<p>این دارو را همراه غذا میل نمایید.</p> <p>به هیچ عنوان کپسول ها را برای مصرف باز نکنید.</p> <p>دیگر دارو های را حداقل یک ساعت قبل یا ۳ ساعت بعد از مصرف این دارو به کار ببرید.</p>
	قرص	400 mg-800mg			
	کپسول	۴۰۳mg			
۵۲	فورزماید / Furosemide		Lasix/Urito/furoside	افزایش دفعات و حجم ادرار، تهوع، سوء هاضمه، گرامپ های شکمی، اسهال، یبوست، لکونی، آنمی، سندرم استیونس جانسون، نارسایی کلیوی، هیپوتانسیون وضعیتی، وزوز گوش، تاری دید، راش، خارش، خشکی دهان، درد قفسه سینه	<p>به منظور کاهش خطر هیپوتانسیون وضعیتی به آهستگی از وضعیت خوابیده و نشسته تغییر وضعیت دهید.</p> <p>نوع خوراکی را بعد از غذا و صبح ها به بیمار بدهید.</p> <p>به منظور کاهش نشانه گوارشی دارو را با غذا یا شیر مصرف کنید.</p> <p>نوع خوراکی را بعد از غذا و صبح ها به بیمار بدهید.</p>
	تزریق (آمپول)	10 mg/ml(2-4 ml)			
	قرص	20-40-80 mg			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	محلول فروزماید (انفوزیون)	۱۰ mg/ ۲۵ cc 250mg/25ml			<p>– میزان مایعات را تا ۲-۳ لیتر در روز افزایش دهید.</p> <p>– تزریق عضلانی می تواند دردناک باشد.</p> <p>– از منابع حاوی پتاسیم استفاده نمایید. (مانند موز، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پرتقال، گوشت)</p> <p>– در معرض طولانی نور خورشید قرار نگیرید.</p> <p>– در صورت تپش قلب، احساس پری گوش و وزوز گوش اطلاع دهید. (در کودکانی که قادر به بیان علائم خود هستند)</p>



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهردار رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۵۳	فنوباربیتال / Phenobarbital		Phenobarb luminal	خواب آلودگی، کهیر، سندرم استیونس-جانسون، تهوع، درد اپی گاستر، اسهال، یبوست، ترومبوسیتوپنی، راش و کهیر، سردرد، توهم	<p>– در صورتی که بیمار نتواند قرص را بلعد می توان قرص را خرد کرده و آن را همراه با غذا و یا مایعات به بیمار بدهید. اجازه ندهید قرص خرد شده را به صورت خشک و مخلوط نشده با مایعات یا غذا مصرف نماید.</p> <p>– در صورت مصرف دراز مدت سطح ویتامین D و اسید فولیک خون بررسی شود.</p> <p>– در صورت فراموشی یک دوز، بلافاصله پس از بخاطر آوردن آن را مصرف نماید مگر اینکه تا زمان مصرف دوز بعدی فرصتی باقی نمانده باشد.</p> <p>– در صورت تب، گلودرد، زخم دهان، خونریزی یا خونمردگی غیر معمول به پزشک معالج اطلاع</p>
	آمپول	100mg/1cc 200mg/1cc			
	قرص	15mg-60mg-100mg			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهر بزرگ رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات	
					<p>دهید.</p> <p>–تازمان ثابت شدن دارو از انجام فعالیتهای خطرناک پرهیز شود، خواب آلودگی ممکن است رخ دهد.</p> <p>–دارو به صورت ناکهانی قطع نشود، علایم سندرم ترک ممکن است رخ دهد.</p>	
۵۴	آمیول	250mg/ 5 cc	Dilantin-Phenytek	<p>عدم تعادل، سرگیجه، سندرم استیونس-جانسون، افت فشار، راش، دوبینی، هیپرپلازی لثه، فلیبیت، تمایلات خودکشی، سردرد، دوبینی، تاری دید، تغییر رنگ ادرار، هیرسوتیسم سندرم دستگش بنفش(وریدی)</p>	<p>– در صورتی که بیمار نتواند قرص را بلعد می توان قرص را خرد کرد و آن را با غذا و یا مایعات مخلوط نمود. بهتر است قبل از مصرف یک لیوان آب بنوشد و سپس قرص حل شده را بلعد. این دارو یک قلبای</p>	
		50-100 mg				کپسول



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	سوسپانسیون	30mg/5 CC 125mg/5ml			قوی است و نباید قبل از آمادگی اولیه بلع شود تا بدینوسیله از تماس مستقیم دارو با مری و معده جلوگیری گردد.
	قرص فنی توئین کامپاند	(فنی توئین سدیم ۱۰۰ میلی گرم + فنوباریتال ۵۰ میلی گرم)			– سوسپانسیون دارو را قبل از مصرف کاملاً تکان دهید. – حداقل ۲-۳ ساعت بین مصرف فنی توئین و آنتی اسیدها فاصله بگذارید.
	کرم	۱%			– بهداشت دهان و دندان و انجام معاینات مکرر دندانپزشکی جهت جلوگیری از حساسیت، خونریزی و هیپرپلازی لثه بسیار اهمیت دارد.
					– تغییر رنگ ادرار به صورتی یا قرمز یا قهوه ای که اهمیت چندانی ندارد.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
					<p>– دارو به صورت ناکهانی قطع نشود ممکن است تشنج رخ دهد.</p> <p>– تا زمان ثابت شدن دارو از فعالیتهای خطرناک پرهیز شود.</p> <p>– وقتی یک برند دارو پایدار شد، نوع برند دارو را تغییر ندهید.</p>



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۵۵	قرص کلسیم کربنات / Calcium carbonat	۵۰۰mg	Caltrate	تهوع – استفراغ، یبوست یا اسهال و نفخ، تشکیل سنگ، بی اشتهایی	– این دارو را با آب زیاد (۲ لیوان) مصرف نمایید . – قرص ها را طبق آزمایشات بیمار) می توان قبل و حین و بعد از غذا مصرف نمود. – از مصرف اسفناج و غلات و حبوبات ، لبنیات در مقادیر زیاد اجتناب کنید.
۵۶	کلیندامایسین / Clindamycin	150 mg -300 mg	Dalacin/Celocin	تهوع، استفراغ، درد شکمی، مدفوع خونی، احساس مزه فلز، بی اشتهایی، راش، کهیر ،لکوپنی،سندرم استیون جانسون،راش، خارش، کهیر،آبسه در محل تزریق	– نگهداری کپسول: در دمای اتاق. – در صورت بروز اسهال شدید باید دارو قطع شود و به پزشک اطلاع دهید. – فرم خوراکی حداقل با یک لیوان آب مصرف شود. – در صورت بروز اسهال مصرف مایعات به ۲ لیتر در روز برسد. – جهت کاهش عوارض گوارشی می توان با غذا مصرف نمود .
		کپسول			
		آمیول (۲ سی سی)			
	شریت	75mg/5cc			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات	
					دارو نباید خرد و جویده شود دارو هر روز در ساعت معین مصرف شود.	
۵۷	Co-Trimoxazole / کوتری موکسازول		Sulfatrim /sepra	سردرد، بثورات جلدی، کهیر، اریتم مولتی فرم، خارش، خواب آلودگی، کاهش اشتها، تهوع، اسهال، استفراغ، یبوست، لگوپنی، تشنج، توهم، هماچوری، الیکوری، یرقان، آنافیلاکسی	-در شیرخواران زیر ۲ ماه توصیه نمی شود. -کنترل بیمار از لحاظ واکنش آلرژیک نظیر راش و تب و کنترل I/O و رنگ ادرار نیز توصیه می شود. -مصرف مایعات تا ۲ لیتر در روز افزایش یابد تا از اثرات آن بر کلیه جلوگیری به عمل آید و در صورت	
	اشکال دارو	نری متوپریم				سولفامتوکسازول
	قرص اطفال	20 mg				100 mg
	قرص بزرگسال	80 mg				400 mg
	شربت	40 mg/5 cc				200 mg/5 cc
آمپول	80 mg/5 cc	400 mg/5 cc				



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
					<p>بروز راش و گلودرد، تب، زخم دهان، کبودی و خونریزی غیر معمول به پزشک اطلاع دهید.</p> <p>– در بیماران فاویسمی ممنوع است.</p> <p>– دارو را با معده خالی یک ساعت قبل از غذا و یا دو ساعت بعد از غذا و با یک لیوان پر از آب مصرف کنید.</p>
۵۸	گان سیگلوویر / Ganciclovir	500mg 250,500mg	Cytovene	<p>سردرد، سر گیجه، راش، خارش، تهوع و استفراغ، آنمی، خشکی دهان، تب، لرز، تشنج، پانکراتیت، درد در محل تزریق</p>	<p>– علایم زیر را گزارش دهید: تب و لرز، گلودرد، کبودی، خونریزی، پتشی.</p> <p>– دارو به همراه غذا مصرف کنید.</p> <p>– از مایعات به میزان کافی مصرف کنید.</p> <p>– در اماکن شلوغ و تماس با افراد عفونی اجتناب نمایید.</p>



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات	
۵۹	کلوگزاسیلین / Cloxacillin	250-500 mg	Orbenin/ Tegopen	تهوع، اسهال، استفراغ، لکونی، درد اپی گاستر، عفونت قارچی، افت فشار خون، زبان مویی یا سیاه، هماچوری، نارسایی کلیه، عطسه، آرتراژی، گیجی، تشنج، تب، لتارژی	<ul style="list-style-type: none"> - در افراد با سابقه تشنج احتمال بروز تشنج وجود دارد. - مایعات به میزان ۲ لیتر در طی دوره های اسهالی میل نمایید. - دارو را خرد نکرده و کپسول ها را نجوید. - دارو را با معده خالی و با یک لیوان پر از آب مصرف کنید. 	
		قرص / کپسول				
		250 mg-500 mg-1 gr				آمپول (ویال)
۶۰	لوئیراستام / levetiracetam	250,500,750,1000mg	/Keppra Levebel	سرگیجه، خواب آلودگی، سایکوز، تفکر خودکشی، درد شکم، فارنژیت، کم خونی (Hb-Hct)	<ul style="list-style-type: none"> - شرایط نگهداری داروی خوراکی: در دمای اتاق. - قرص به طور کامل بلعیده شود و از خرد کردن و جویدن قرص خودداری شود. - به منظور کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه با غذا یا شیر مصرف کنید. - داروهای خوراکی را در درجه 	
		قرص				
		100mg/ml				شربت (محلول خوراکی)
		100mg/ml				آمپول



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
					حرارت اتاق نگهداری نمایید. - محلول خوراکی از طریق کاپ خود دارو اندازه گرفته شود و بدین منظور از قاشق چایخوری دیگر استفاده نشود.
۶۱	مترونیدازول / Metronidazol	500mg/100ml	Flagyl	سردرد، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، تشنج، خارش، تیرگی رنگ ادرار، فلبیت، اسهال، یبوست، سندرم استیون-جانسون، بیماری دندان، ترس از نور، خشکی دهان، احساس طعم فلز در دهان	- در صورت عدم توانایی بلع قرص، می توان آن را قبل از مصرف خرد کرد یا جوید. - فرآورده ی خوراکی دارو را باید بلافاصله قبل، همراه یا بلافاصله بعد از غذا میل کرد. - در صورت ایجاد علائم عفونت ثانویه (برجستگی های خزه مانند بر روی زبان، خارش و ترشح واژینال، مدفوع شل و متعفن) و آلرژی به پزشک اطلاع دهید.
		آمپول			
		قرص			
		سوسپانسیون			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۶۲	متوپرولول سوکسینات / Metoprolol succinate	قرص	Lopressor /Metoral /Topral XL	افسردگی، گیجی، خواب آلودگی، سردی اندام، سردرد، بی خوابی، کاهش ضربان قلب، افت فشارخون، یبوست، اسهال، نفخ شکم - تهوع، تنگی نفس، سرفه شبانه، درد قفسه سینه، راش، کهیر، خارش، خشکی دهان	- دارو را ناگهانی قطع نکنید قطع تدریجی دارو ظرف ۲ هفته صورت می گیرد. - از آنجایی که احتمال بروز گیجی وجود دارد از انجام اعمال خطرناک پرهیز نمایید. - هر گونه تنگی نفس به ویژه به هنگام فعالیت یا زمان دراز کشیدن، سرفه شبانه و تورم انتها ها را به پزشک اطلاع دهید.
		۵۰mg			
		۱ mg/cc			
۶۳	متیل پردنیزولون / Methylprednisolone	تزریقی (پودر)	Depoject	بی خوابی، سرخوشی، ادم، هیپرتانسیون، افزایش اشتها، زخم گوارشی، آکنه، راش، افزایش احتمال عفونت، خونریزی گوارشی، تاکیکاردی، برافروختگی، افزایش اشتها	- در درجه حرارت ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. - مصرف مواد حاوی کلسیم، پتاسیم و پروتئین را افزایش داده و مصرف کربوهیدرات را کاهش دهید.
		40mg/ml, 500 mg			
		قطره، محلول (خوراکی)			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۶۴	آمپول	500 mg 1000 mg	Merrem meronem	سردرد، اسهال، راش پوستی، استفراغ، فلبیت محل رگ محیطی، تشنج، آنافیلاکسی، سرگیجه، هایپوتانسیون، سندرم استیون جانسون، ناکیکاردی	– در صورت علائم اسهال شدید، خونریزی و کبودی، خارش واژن، مدفوع بدبو و درد مفاصل اطلاع دهید. – به احتمال ترشح در شیر در دوران شیر دهی از دارو مصرف نکنید.
		meropenem / مروپنم			
۶۵	مومتازون / Mometasone		Asmanex نازونکس – رستانکس	خستگی، سردرد، بی خوابی، رinit آلرژیک، خشکی گلو، درد گوش، خونریزی از بینی، تهوع، استفراغ بی اشتهایی، درد پشت و درد عضلانی، درد شکم، نفخ، زخم بینی، سرفه	– تاریخ بازکردن اسپری را یادداشت نمایید ظرف ۴۵ روز بعد از باز شدن یا طبق دستور کارخانه باید دوز انداخته شود. – دارو باید به صورت منظم و ساعات خاصی از روز مصرف شود،



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	اسپری بینی (بودر استنشاقی)	۵۰ mcg per inhalation %0.05/20cc			در صورت مصرف (یکبار روزانه) بهتر است عصرها مصرف شود. - طی درمان طولانی مدت در صورت پیدایش تغییرات بینایی نظیر تاری دید به پزشک اطلاع دهید.
۶۶	مونته لوکاست / Montelukast		singulair	سردرد، سرگیجه، خستگی، درد شکمی، راش، سرفه، دندان درد، افکار خودکشی، توهم، اضطراب، افسردگی، تهوع ، اسهال، استفراغ، احتقان بینی، آنافیلاکسی	شرایط نگهداری: دارو در درجه حرارت ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و دردمای خنک نگهداری شود. - روزانه عصرها مصرف شود. - ساشه را می توان به صورت
	قرص	10 mg			
	قرص جویدنی	4,5mg			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	ساشه	4 mg/sachet			مستقیم یا با یک قاشق غذا خوری غذای نرم و پوره مانند (هویج، سس، بستنی یا برنج) مخلوط کرده و مصرف کرد. - ساشه باز شده را در عرض ۱۵ دقیقه مصرف کنید.
۶۷	میدازولام / Midazolam		Hypnovel/ versed	گیجی، سردرد، آناکسی، هیپوتانسیون، ناکیکاردی، تاری دید، دو بینی، راش، کهیر، تهوع، استفراغ، خارش، آینه ، سرخوشی، بی خوابی، ایست قلبی،	- شرایط نگهداری : در درجه حرارت اتاق. - تا زمانی که بیمار خواب آلود است به هنگام حرکت به بیمار کمک نمایید. - دسترسی سریع به وسایل احیا داشته باشید و از O2 جهت حمایت راه تنفسی استفاده کنید.
	آمپول	5 mg/1cc			
	شریت	2mg/ml			
۶۸	والپرات سدیم / Valprat sodium		Epilim/ Chrono/ Depakene	آرامش بیش از حد، لرزش، اختلال رفتار، توهم، تهوع و استفراغ، اسهال، بیوست، درد شکمی، افزایش سطح	- شرایط نگهداری: در چه حرارت ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد. - این دارو در طولانی مدت می
	شریت	200 mg/5 ml			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	قرص	200 mg و 500 mg		آنزیم های کبدی، افزایش ترشح بزاق، نارسایی کبدی، افزایش PT، کبود شدگی، خون دماغ، حساسیت به نور، ریزش مو، التهاب مخاط دهان، خواب آلودگی، سردرد، سرگیجه	تواند وابستگی فیزیکی ایجاد کند. -از قطع ناگهانی دارو بپرهیزید زیرا موجب تشنج خواهد شد. -از رانندگی و اقدامات نیاز به هوشیاری اجتناب کنید.
	کپسول	300 mg			
	تزریقی	100 mg/ml			
۶۹	ونکومايسين / vancomycin	500mg	Vancocin-Firvanq	راش، وزوز گوش، تهوع، فلبیت، تب و لرز، ایست قلبی، افت فشار خون، سندرم مرد قرمز، تنگی نفس، آنافیلاکسی	- در صورت وزوز گوش یا سرگیجه به پزشک اطلاع دهید. - گلودرد، تب، ضعف را گزارش کنید زیرا ممکن است نشانی از عفونت وسیع باشد.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات	
۷۰	آمیپول	10mg, 2 mg, 1mg	Aqua mephyton	درد و تورم در محل تزریق عضلانی، اریتم، قرمزی، خارش، برافروختگی صورت، احساسی طعم بد در دهان در تزریقات مکرر، ایست تنفسی، تنگی نفس	- دارو را در درجه حرارت اتاق نگه دارید. - در صورت قرمز شدن ادرار، خون در مدفوع، استفراغ خونی، خونریزی زیر جلدی و ... اطلاع دهید - از مسواک نرم استفاده کنید - از غذا های غنی از ویتامین k مانند برگهای سبز سبزیجات تازه، گوشت، شیر گاو، روغن گیاهی، گوجه فرنگی و زرده تخم مرغ استفاده کنید. - لته بیمار را از نظر قرمزی و خونریزی کنترل کنید.	
		10 mg				قرص



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۷۱	ویتامین ث Vitamin C (Ascorbic Acid)	۱۰۰mg/۵ cc	Vita-c	سرگیجه، اسهال، ضعف، سنگ کلیه، سوزش سر دل، تهوع، استفراغ، بی اشتها، التهاب در محل تزریق	<p>– قرص یا کپسول خرد وجود دارد نشود. – محتویات کپسول را نمیتوانید با ژله مخلوط و مصرف کنید.</p> <p>– در دوران مصرف دارو از استعمال دخانیات (سیگار و...) پرهیز شود سطح دارو را کاهش میدهد.</p> <p>– در درجه حرارت اتاق و دور از نور و منجمد شدن نگهداری کنید. فرم تزریقی ویتامین C باید در یخچال نگهداری شود.</p> <p>– لزوم مصرف مواد غذایی نظیر مرکبات در رژیم غذایی</p>
		آمپول	Vevita		
		قرص جوشان	۱۰۰0mg		
		پودر	۵۰۰mg		
	قرص جویدنی	250,500mg			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۷۲	هپارین سدیم / Heparin sodium	5000-10.000 واحد	Hepalean	خونریزی، کاهش پلاکت، هماتوم، زخم،هماچوری،هموراژی،آنمی،تب، لرز،سردرد،راش،کھیر،خارش،آنافیلاکسی	<p>– از مصرف داروهای بدون نسخه اجتناب کنید ممکن است تداخل جدی پدید آید.</p> <p>– این دارو ممکن است طی دوه خون ریزی فعال (پریود) بسته به شرایط قطع شود.</p> <p>– به منظور پیشگیری از خون ریزی از لثه ها از مسواک های نرم استفاده نمایید.</p> <p>– از ورزش های تهاجمی اجتناب کنید از تیغ و تزریق عضلانی استفاده نکنید.</p> <p>–علائم خونریزی را گزارش کنید.</p>



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهر بزرگ رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
۷۳	هیدروکسی اوره/ Hydroxyurea	کپسول: 500mg	هیدریا / Hydrea	— سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، تشنج، تهوع و استفراغ، لکوپنی، اریتم پوست، تب و لرز، افزایش سطح BUN و Cr، راش، کهیر، خارش، آنمی	شرایط نگهداری: دارو در ظروف دربسته و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود. — در صورتی که بیمار قادر به بلع کپسول نباشد آن را باز نموده با آب مخلوط و بلافاصله میل کند. — سطوح خونی پس از سه روز بررسی می شود.
۷۴	هیدروکسی زین / Hydroxyzine		Atozine	خواب آلودگی، سرگیجه، هیپوتانسیون، خشکی دهان، ترمبوز، کهیر، ویزینگ، تشنج، تهوع، اسهال	— قرص را می توان قبل از مصرف خرد نمود. — تجویز داخل عضلانی باید عمیق صورت گیرد. — نباید تزریق زیر جلدی، داخل شریانی و یا داخل وریدی تجویز
		۱۰۰ mg / ۲ ml			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهر بزرگ رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	قرص	۱۰-۲۵ mg			شود زیرا باعث صدمه به بافت می گردد. - روزانه وضعیت مخاط دهان کنترل گردد. - از رانندگی یا انجام کارهای خطرناک نیازمند هوشیاری و هماهنگی جسمانی اجتناب گردد.
	شریبت	۱۰ mg / ۵ml			
۷۵	هیدروکورتیزون / Hydrocortisone		Emcort Cortef westcort	بی خوابی، سوزش سردل، عصبانیت، مشکلات گوارشی، تعریق، آکنه، افزایش اشتها، بر افروختگی صورت، تاخیر در بهبود زخم، ابتلا بیشتر به عفونت، اسهال، یبوست، تاکیکاردی، آمبولی	- دارو را در درجه حرارت اتاق نگه دارید. - در صورت تب، گلودرد، درد عضلانی، افزایش وزن و ادم اطلاع دهید. - مصرف الکل و کافئین را کاهش دهید. - در صورت مصرف دارو به صورت موضعی محل را نپوشانید.
	ژل	۱ و ۰/۵ درصد			
	پماد	۱، ۰/۵ و ۲/۵ درصد			
	سوسپانسیون خوراکی	۱۰ میلی گرم / ۵ میلی لیتر			
	تزریقی	۵۰-۱۰۰mg ۲۵۰-۱۰۰۰mg			



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهرپور رشت

راهنمای دارویی (آموزش به بیمار)

نکته: داروها هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک هستند.

تعریف نام ژنریک دارو: نام عمومی دارو می باشد و معمولاً اسامی ژنریک با پرینت کوچک روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

تعریف نام تجاری دارو: شرکت های مختلف دارویی فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی مختلف تجاری تولید می کنند، معمولاً اسامی تجاری با حروف بزرگ روی جعبه یا شیشه دارو نوشته می شود.

ردیف	نام ژنریک	دوز دارو	نام تجاری	واکنش ناخواسته/عوارض جانبی	ملاحظات
	قرص	10mg			-از مصرف آسپرین و دیگر داروها به طور سرخود اجتناب کنید.
۷۶	یوموگی/ Yomogi	کپسول: 250mg	SACHAROMY CES Boulardi	درد شکم ، نفخ و اسهال	- نگهداری: در دمای ۱۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد - بهتر است همراه غذا میل شود. - در صورت حساسیت به مخمر استفاده نشود. - در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و بیماران دارای نقص سیستم ایمنی حتماً باتشخیص پزشک معالج باشد. - همزمان با داروهای ضد افسردگی مصرف نشود.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
۱۷ شهریور رشت

رفرنس:

- ۱- تیموری ف، بهاری ن. ۱۳۹۴. داروهای ژنریک ایران همراه با داروهای وارداتی و تک نسخه ای با مراقبت پرستاری. تهران: آبادیس طب. ۱۵۴۸ ص.
- ۲- رسولی م، تیموری م. ۱۳۹۵. مرجع کامل داروهای ژنریک ایران. تهران: اندیشه رفیع. ۱۲۴۸ ص.
- ۳- علی نیا ش. ۱۳۸۷. مرجع کامل دستنامه داروهای ژنریک ایران. تهران: جامعه نگر. ۱۲۰۰ ص.