

بیماری‌های منتقله از پشه آئدس

۱- تب دنگ ۲- زیکا ۳- چیکونگونیا ۴- تب زرد

عامل بیماری

تب دنگی سریعترین عفونت ویروسی منتقل شونده توسط ناقل می باشد که ویروس آن، عضوی از خانواده Flaviviridae ویروس ها است. چهار نوع سروتایپ دارد.

ویروس دنگ از طریق گزش پشه آئدس اجیپتی و آئدس آلبوپیکتوس انتقال می‌یابد.

روش انتقال بیماری دنگ

۱- انتقال از پشه به انسان ۲- انتقال از انسان به پشه ۳- سایر موارد

دوره نهفتگی

دوره نهفتگی بیماری ۴ تا ۱۰ روز بعد از گزش می‌باشد.

پشه ۸ تا ۱۲ روز بعد از خوردن خون آلوده به ویروس تا پایان زندگی‌اش آلوده‌کننده خواهد بود.

سیر بالینی بیماری

۱- فاز تب

➤ ۲ تا ۷ روز طول می‌کشد

➤ سردرد شدید

➤ درد عضلانی و مفصلی و استخوانی

➤ بی‌اشتهایی و استفراغ

➤ بثورات جلدی

➤ خون‌ریزی مخاطی

➤ اشکال در تنفس

➤ تب

➤ درد پشت چشم

۲- فاز بحران

➤ با قطع تب شروع می‌شود.

➤ ۲۴ تا ۴۸ ساعت طول می‌کشد

➤ اکثر بیماران در طی این فاز رو به بهبود

می‌روند.

➤ بعضی‌ها دچار نشت پلاسما می‌شوند.

➤ پلورال افیوژن و آسیت

➤ هیپوپروتئین و افزایش هماتوکریت

➤ شوک به دنبال استفراغ خونی و تب

۳- فاز بهبودی

➤ جذب تدریجی مایع خارج عروقی

➤ بهبود حال عمومی و اشتها

➤ دیورز

➤ بثورات جلدی به اصطلاح جزایر سفید در

دریای سرخ



➤ خارش جنرالیزه

➤ برادیکاردی

درمان

گروه A: درمان سرپائی

مصرف

۱- مصرف مایعات کافی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ۱۲ شهریور

بیماریهای منتقله از پشه آئدس (Dengue Fever)



تهیه و تنظیم: صابره محبی (پرستار بخش عفونی)
تحت نظارت زهرا خورشیدی (کارشناس کنترل عفونت)

تابستان ۱۴۰۳

➤ هموراژی شدید

➤ اختلال شدید ارگانها

ملاک های ترخیص

➤ عدم وجود تب برای حداقل ۴۸ ساعت بدون

استفاده از ضد تب.

➤ بازگشت اشتها

➤ علائم حیاتی در محدوده ی طبیعی

➤ بهبود بالینی قابل مشاهده

➤ برون ده ادرار کافی 1.5-0.5 ml/kg/h

➤ حداقل ۲ تا ۳ روز پس از بهبودی از شوک می-

گذرد.

➤ بدون دیسترس تنفسی ناشی از پلورال افیوژن و

بدون آسیت

➤ نبود علائم خونریزی

➤ تثبیت هماتوکریت

منبع: راهنمای تشخیص و درمان تب دنگی، تب دنگی، هموراژیک (کودکان و بزرگسالان)، نسخه دوم، مرداد ۱۴۰۳

مرداد ۱۴۰۳

۲- هر ۶ ساعت دفع ادرار دارند

۳- هیچ علامت هشدار بویژه هنگام قطع تب، ندارند

۴- هماتوکریت نرمال دارند

۵- داروهای کاهنده تب بکار می روند

۶- بهترین گزینه استفاده از استامینوفن است. از

مصرف استروئید باید خودداری شود



گروه B: ضرورت بستری وجود دارد.

➤ دارای علائم هشدار

➤ بدون علائم هشدار اما همراه با بیماریهای

زمینه‌ای (باردار، شیرخوار، سالمند، چاقی،

دیابت، فشارخون، نارسایی قلبی و ...)

گروه C: تب دنگ نیاز به درمان فوری

➤ نشت شدید پلاسما که به شوک دنگ و یا

احتباس که مایعات با تنگی نفس منجر می شود.