



دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
شهریار رشت
۱۷

آنچه درباره زردی (ایکتر) نوزادی

باید بدانید



تهریه و تنظیم: کارگروه آموزش سلامت بخش نوزادان

تحت نظرارت: سوپر وایزر آموزش سلامت

تیر ۱۴۰۳

توصیه های خودمراقبتی

شماره تماس گروه حامی جهت پاسخ به سوالات شیرما در:

۰۹۰۵۵۹۸۲۱۱۷

اطلاعات تماس (بخش نوزادان):

۰۱۳-۳۳۳۶۹۳۹۱-۳۳۳۶۹۰۴۴-(۲۷۳)

آدرس صفحه "آموزش به بیمار" بیمارستان:

<https://17shahrivar.gums.ac.ir>



منبع:

درسنامه پرستاری کودکان و نگ. ۱۳۹۵. ترجمه پوران سامی،

مصطفی بدیعی، فاطمه احدی. تهران: نشر و تبلیغ بشری. ۶۴۳-

.۶۵۳

عارض فتوترالپی چگونه بهبود می یابد؟

با بهبود زردی نوزاد و قطع فتوترالپی و شیردهی مکرر بهبود می یابد.

آیا می دانید چگونه نوزاد بیقرار را آرام کنید؟

نوزاد را بغل کرده و به آرامی تکان داده و یا کمی شکم نوزاد را ماساژ دهید.

آیا از مراقبت های بعد از ترخیص را می دانید؟

۱- نوزاد را جهت افزایش ادرار و اجابت مزاج و دفع بیلی روین باقی مانده، با شیر مادر تغذیه نمایید.

۲- زردی دور چشم به دلیل چشم بند و زردی ناحیه پوشک به دلیل نرسیدن نور دستگاه نور درمانی به زیر پوشک می باشد و بعد چند روز خود به خود بر طرف می شود.

۳- صورت و تنہ نوزاد را از نظر زرد شدن کنترل نمایید.

۴- در صورت تعویض خون نوزاد در بیمارستان، آزمایش شناوری سنگی از نوزاد را پس از ترخیص طبق زمان تعیین شده حتما انجام دهید.

در صورت بروز علایم زیر به مرکز درمانی مراجعه کنید:

- زرد شدن مجدد صورت و تنہ و اندامها

- خوب شیر نخوردن

آیا از مراقبت نوزاد در زمان فتوترایی اطلاع دارید؟

- تغییر وضعیت نوزاد جهت رسیدن نور به تمام پوست بدن در زمان فتوترایی (نوردرمانی).
- پوشاندن چشم با چشم بند و اندام تناسلی نوزاد با پوشک.
- رعایت فاصله قانونی فتوترایی با پوست نوزاد ۲۵ سانتی متر جهت جلوگیری از سوختن پوست نوزاد
- عدم استفاده از کرم و لوسیون در هنگام فتوترایی جهت جلوگیری از سوختگی پوست نوزاد.
- جهت جلوگیری از صدمات چشم، خاموشی نور دستگاه در هنگام شیردهی.
- بررسی رنگ و قوام مدفوع.

نکته: در هنگام شیردهی، چشم بند نوزاد برداشته شود تا تماس چشمی نوزاد با چشم مادر برقرار گردد.

آیا میدانید عوارض فتوترایی چیست؟

- 1- مدفوع شل و سبز
- 2- دانه های قرمز روی پوست بدن
- 3- سرد شدن بدن
- 4- کم آبی و خشک شدن پوست نوزاد
- 5- سندروم کودک برزنژه (پوست رنگ فهوه ای - سبز)

آیا از روش های درمان زردی (ایکتر) اطلاع دارید؟

بهترین راه درمان شروع فتوترایی (نوردرمانی) در بیمارستان و یا اجاره دستگاه از مراکز پرستاری مراقبت در منزل (طبق دستور پزشک) می باشد.

- بیلی رویین ۱۹ تا ۱۵: نوزاد در بیمارستان بستری می شود و فتو تراپی (نوردرمانی) آغاز میشود.
- بیلی رویین ۲۰ تا ۲۵: علاوه بر فتوترایی احتمال تعویض خون نیز وجود دارد.



آیا میدانید چگونه میتوانید از بروز زردی (ایکتر) پیشگیری کنید؟

برای پیشگیری از زردی، تغذیه هرچه زودتر با شیر مادر و شیردهی مکرر را انجام دهید و همچنین پس از ترخیص در منزل به نوزاد خوب شیر دهید تا سبب افزایش دفع مدفوع و کاهش زردی شود.

آیا از تغذیه مناسب در زردی (ایکتر) اطلاع دارید؟

شیردهی مکرر با شیر مادر توصیه میشود و پس از شیر دادن، آروغ نوزاد را گرفته و آن را به پهلوی راست بخوابانید.

والدین گرامی مطالب زیر جهت افزایش آگاهی شما در مورد بیماری فرزندتان می باشد لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

آیا میدانید زردی (ایکتر) چیست؟

زردی ممکن است در بدو تولد یا در هر زمان از دوره نوزادی بروز کند. علت زردی افزایش بیلی رویین (ماده ای زرد در خون است که از تخریب سلول خونی فرسوده تولید می شود) بیش از اندازه ای مجاز در خون نوزاد است.

شايع ترین علامت زردی (ایکتر) را می شناسید؟

رنگ زرد در اطراف صورت، سفیدی چشم، گردن و شکم و پaha می باشند که باید مورد توجه قرار گیرد.

آیا از روش های تشخیص زردی (ایکتر) اطلاع دارید؟

زردی از طریق معاینه (از رنگ پوست و مخاط چشم ها) و انجام آزمایشات خونی اولیه قابل تشخیص میباشد.

