



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کیلان
مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی
شهریور رشت

با "نوردرمانی" در درمان زردی نوزادان آشنا شوید



تهیه و تنظیم: کارگروه آموزش سلامت بخش نوزادان
تحت نظرارت: سوپر وایزر آموزش سلامت

تیر ۱۴۰۳

شماره تماس بیمارستان (نوزادان): ۰۱۳-۳۳۳۶۹۳۹۱-۳۳۳۶۹۰۴۴-(۲۷۳)
شماره تماس جهت پاسخ به سوالات شیر مادر: (از ساعت ۸ تا ۲۰)
۰۹۰۵۵۹۸۲۱۱۷

آدرس صفحه "آموزش به بیمار" بیمارستان:
<https://17shahrivar.gums.ac.ir>



منبع:
۱- هاکنبری مریلین، ویلسون دیوید. ۱۳۹۹. درسنامه پرستاری کودکان و ونگ. ترجمه سونیا آرزومنیاس، مهناز شوقی، مهناز سنجری. تهران: جامعه نگر. ۶۲۰-۶۱۶.

2-updatedfree.ir/topic.htm?path=jaundice-in-newborn-infants-beyond-the-basics

شايعترین عوارض نوردرمانی (فتوترابی) چیست؟

- مدفوع شل
- دانه های پوستی قرمز و گذرا
- کاهش یا افزایش گذرای دمای بدن
- کم آبی (اگر شیرخوار به اندازه کافی شیر مادر دریافت نکند، گرمای بیش از حد و کم آبی ممکن است رخ دهد. بنابراین رنگ پوست، دمای بدن و تعداد پوشک خیس نوزاد را به دقت کنترل نمایید)
- قرمزی ناحیه زیر پوشک (به علت مدفوع شل و دفع مکرر)
- سندروم کودک برزنده (برخی از نوزادان رنگ پوست و رنگ ادرار آنها به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری تغییر می کند که این تغییر مضر نیست و به تدریج برطرف می شود).

عارض مربوط به "نوردرمانی" پس از چند هفته به تدریج و بدون درمان برطرف می شود.

توصیه های خودمراقبتی

آیا از فاصله دستگاه "نوردرمانی" (فتوتروپی) با نوزاد اطلاع دارید؟

فاصله دستگاه با پوست نوزاد بر اساس شرکت تولید کننده تعیین می شود. لامپ هالوژن اگر به پوست خیلی نزدیک باشد باعث سوختگی می شود معمولاً فاصله حداقل ۳۰ سانتی متر مناسب می باشد.

نحوه حفظ دمای نوزاد در زمان "نوردرمانی" (فتوتروپی) را اطلاع دارید؟

نگهداشت نوزاد به حالت خمیده و قرار دادن پتو های لوله شده در اطراف نوزاد می تواند سبب راحتی و حفظ دمای بدن نوزاد شود.

تغذیه نوزاد تحت "نور درمانی" چگونه است؟

- شیردهی مکرر هر ۲ تا ۳ ساعت (زیرا بیلی روبيين از طريق ادرار و مدفوع دفع می شود. در طول فتوتروپي باید تغذیه با شیر مادر ادامه يابد)
- هم اطاقی مادر با نوزاد

- عدم استفاده از آب قند (فقط شیر دهی با شیر مادر)

آیا از اقدامات در زمان "نور درمانی" (فتوتروپی) اطلاع دارید؟

- قرار دادن نوزاد در مقابل منبع نور به صورت برهنه
- تغيير وضعیت مكرر نوزاد جهت برقراری نور به تمام سطح بدن
- پوشاندن چشمهاي نوزاد با پد يا ماسك تيره با اندازه مناسب (براي پيشگيري آسيب به چشمها)
- پوشاندن ناحيه ژنิตال (اندام جنسی) با پوشک مناسب

مراقبت از چشمها بعد بستن چشم بند چگونه است؟

- قبل بستن چشم بند باید چشم نوزاد بسته باشد.
- توجه کنيد چشم بند بینی نوزاد را مسدود نکند و مانع تنفس نوزاد نشود.
- هر ۴ تا ۶ ساعت چشم ها از نظر ترشح و فشار زياد روی پلک ها بررسی کنيد.



حتماً از چشم بند و پوشک برای نوزاد در زمان "نوردرمانی" استفاده نمایید.

والدين گرامي، مطالب زير جهت افزایش آگاهي شما در مورد "نور درمانی" می باشد لطفاً به نکات زير توجه فرمایيد:

آیا میدانيد "نور درمانی" (فتوتروپی) چيست؟

"نور درمانی" يا "فتوتروپی" رايچ ترين درمان پزشكى برای زردي در نوزادان است. زردي تغيير رنگ پوست و يا سفیدي چشم به رنگ زرد است که



اغلب در نوزادان تازه متولد شده دیده می شود. اين تغيير رنگ به علت افزایش ماده زرد رنگي به نام بيلی روبيين در بدن ايجاد می شود. "نوردرمانی" شامل قرار دادن پوست نوزاد در معرض منبع نور مناسب می باشد تا بيلی روبيين به قسمت هايي تجزيء شود که راحت تر از طريق مدفوع و ادرار دفع شود.

آیا از نحوه کار با دستگاه "نور درمانی" (فتوتروپی) اطلاع دارید؟

- دستگاه شامل ۴ یا ۸ یا ۱۲ یا ۱۶ لامپ با طلق محافظ است.
- دارای نور آبي و زمان سنج نشان دهنده طول عمر لامپ و يك دكمه جهت روشن و خاموش کردن دستگاه می باشد.
- با فلاش هاي روی دستگاه زمان کافي جهت روشن ماندن دستگاه فتوتروپي تنظيم می شود.