

## معیار Four score :

ابراز جدیدی برای ارزیابی سطح هوشیاری می باشد که چهار جزء را در بیماران بررسی می نماید. امتیاز هر جزء از ۰ تا ۴ و در نتیجه امتیاز کل از ۰ تا ۱۶ می باشد .

شاخص	امتیاز
<b>باز نمودن چشم ها</b>	
پلک ها باز است یا نسبت به دستور پلک ها را باز می کند و یا شیء را تعقیب می کند .	۴
پلک ها را باز می کند اما با چشم چیزی را تعقیب نمی کند .	۳
پلک ها بسته است اما نسبت به صدای بلند آن ها را باز می کند.	۲
پلک ها بسته است اما نسبت به محرک دردناک آنها را باز می کند .	۱
پلک ها نسبت به محرک دردناک هم بسته می مانند .	۰
<b>پاسخ حرکتی به اقدامات پرستاری</b>	
نشان دادن اعداد با انگشتان دست یا مشت کردن آن طبق دستور	۴
محل درد را مشخص می کند .	۳
در پاسخ به محرک دردناک اندام هایش را خم می کند .	۲
در پاسخ به محرک دردناک اندام هایش را باز می کند .	۱
عدم پاسخ به محرک دردناک یا انقباض عمومی عضلات	۰

رفلکس ساقه مغز	
۴	واکنش مردمک و قرینه وجود دارد .
۳	یکی از مردمک ها گشاد و ثابت است .
۲	فقدان واکنش مربوط به مردمک یا قرینه
۱	فقدان هر دو واکنش مردمک و قرینه
۰	فقدان واکنش مربوط به مردمک و قرینه و سرفه
تنفس	
۴	لوله داخل نای ندارد و الگوی تنفسی عادی است .
۳	لوله داخل نای ندارد و الگوی تنفس شین استوک است .
۲	لوله داخل نای ندارد و تنفس نامنظم است .
۱	تعداد تنفس بیمار از تعداد تنفس دستگاه ونتیلاتور بیشتر است .
۰	تعداد تنفس بیمار مساوی با تعداد تنفس دستگاه ونتیلاتور یا آپنه است .

تهیه کننده: خانم فاطمه گنجیان (کارشناس پرستاری و رابط آموزش پرستاری بخش داخلی یک)  
 زیر نظر آذر رضاصفت (کارشناس ارشد پرستاری کودکان و سوپروایزر آموزشی بیمارستان ۱۷ شهریور)  
 منبع: غفاری، س. محمودی، م. مرور جامع DRS پرستاری داخلی و جراحی. انتشارات جامعه نگر.  
 چاپ پنجم. سال ۱۳۹۹

بهار ۱۴۰۳